

本种与 *E. inderiensis* 极相似, 但无种阜, 原产准噶尔和阿富汗, 模式标本采自 Songaria Orientali Versus Lacum Saisang-Nor. (in Montibus Arganaty) 按 Saisang-Nor 即斋桑泊, 今属我国境外, 而境内系据中草药普查记载, 现因无标本无法核实, 故暂存疑。

#### 78. 苏甘大戟 (新拟) (新疆植物检索表)

*Euphorbia schuganica* B. Fedtsch. in O. & B. Fedtsch., Consp. Fl. Turk. 6: 307. 1916; Prokh. in Kom. Fl. URSS 14: 387. 1949; 新疆植物检索表 3: 258. 1983; J. S. Ma & C. Y. Wu in Collect. Bot. 21: 108. 1992.

本种于 1983 年首次记载产于新疆和静, 但据称与《苏联植物志》的描述仍存在差异。工作者未见标本, 待证。另本种中文名新拟来自塔吉克斯坦的苏甘 (模式产地) 而非英国的苏格兰。

#### 79. 百步回阳 云南种子植物名录

*Euphorbia sessiliflora* Roxburgh. Fl. Ind. ed 2, 2: 471—472. 1832; Boiss. in DC. Prodr. 15 (2): 76. 1862; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 5: 257 1887; 云南种子植物名录 1: 442. 1984.

本种为肉质多汁类, 具类似土豆样的根状茎, 总苞红色, 单一或两个, 原产印度次大陆, 据记载云南西南部有分布, 系根据中草药普查中所包括标本, 现存无标本, 故暂存疑。

#### 80. 西格尔大戟 (新疆植物检索表)

*Euphorbia seguieriana* Neck. in Acta Akad. Theod. Pall. 2: 493. 1770; Prokh. in Kom. Fl. URSS 14: 395. 1949; Gamajun. in Pavl. Фл. Казахст. 6: 89. tab. 12. f. 1. 1963; 新疆植物检索表 3: 258. 1983; J. S. Ma & C. Y. Wu in Collect. Bot. 21: 114. 1992.

本工作者未见标本。

### 67. 红雀珊瑚属 *Pedilanthus* Neck. ex Poit.

Neck. ex Poit. in Ann. Mus. Par. 19: 390. 1812; Kurz. For. Fl. Brit. Burm. 2: 418. 1877; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 3: 257. 1880. — *Euphorbia* Linn. Sp. Pl. 453. 1753. p. p.

直立灌木或亚灌木; 茎带肉质, 具丰富的乳状汁液。叶互生, 全缘, 具羽状脉; 托叶小, 腺体状或不存。花单性, 雌雄同株, 聚集成顶生或腋生杯状聚伞花序, 此花序由一鞋状或舟状的总苞所包围; 总苞歪斜, 两侧对称, 基部具长短不等的柄, 且盾状着生, 顶端唇状 2 裂, 内侧的裂片比外侧的狭而短; 腺体 2—6, 着生于总苞的底部或有时