

球形,长约6毫米,初期灰色,稍被微细毛,后变光亮,宿存花柱长2毫米。花期2—3月,果期6—7月。

产福建东南部(安溪)、广东(连县及广州附近)、贵州(清溪),生河岸或林下。模式标本采自福建安溪。

Hance 发表本种时仅有花的描写,本文为补述果实。

12. 头花黄杨

Buxus cephalantha Lévl. et Vant. in Fedde, Rep. Sp. Nov. 3: 20. 1906, Hatusima in Journ. Dept. Agr. Kyūsyū Univ. 6 (6): 316, f. 21, Pl. 20(5), f. 1. 1942, p. p. excl. Pl. ex Kwangtung, Tai-young-shan. — *Buxus sempervirens* L. var. *microphylla* Lévl. Fl. Kouy-Tchéou, 160. 1914. — *Buxus harlandii* Hance var. *linearis* Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 237. 1931. — *Buxus harlandii* Hance var. *cephalantha* (Lévl. et Vant.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 14: 237. 1933.

12a. 头花黄杨(原变种) 图版 11: 1—2

var. **cephalantha**

小灌木,高30—60厘米;分枝极密;小枝四棱形,直径0.5—1毫米,被轻微短柔毛,节间长3—5毫米。叶薄革质,倒卵状匙形或匙形,长8—12毫米,宽3—4毫米(如贵州龙里蒋英8403号),或匙状线形,长1.5—2厘米,宽2.5—4毫米(如广西北部无名92839号),先端均钝,或有小尖凸头或浅凹口,基部狭楔形,两面中脉凸出,叶面侧脉致密、明显,与中脉约成45°角,中脉上略被微细毛;叶柄长0—1毫米。花序顶生兼腋生,头状,花序轴长3—5毫米,密生软毛;苞片6—8对,卵状三角形,先端急尖,长1.5毫米,背面近基部有毛;雄花:无花梗,萼片卵形,长1.3毫米,无毛,不育雌蕊高约0.8毫米;雌花:萼片卵状椭圆形,长约1.5毫米,受粉期间子房较花柱为长。果卵形,长达6毫米,初被微硬绒毛,后变近无毛,仅在扩大镜下可见轻微细毛,宿存花柱长1.5毫米,柱头倒卵形,下延达花柱中部。花期3月,果期7月。

产贵州中南部(平坝、都匀、龙里一带)、广西北部。模式标本采自贵州平坝。

笔者见到的广西标本,它和 *Buxus harlandii* var. *linearis* Hand.-Mazz. 的模式标本照片以及他所描述的形态,完全相符。本种在 Lévillé et Vaniot 原始描述,本极简略,仅谓“本种区别于 *Buxus sempervirens* L. 处,为果平滑无网纹,集生枝的顶端,叶匙形”。Rehder 对 *Buxus harlandii* var. *cephalantha* 的描述,亦仅谓“它异于原种处,主要在于体极小,高约30厘米,具短的小枝,叶长6—11毫米,部分叶倒卵形(8:4毫米),花序多顶生”。两者均未提及雌雄花。

12b. 汕头黄杨(变种) 图版 11: 3—4

var. **shantouensis** M. Cheng, 植物分类学报 17 (3): 97. 图版 7: 1.