

标本,书此待考。

2. 长叶柄野扇花 图版 13

Sarcococca longipetiolata M. Cheng, 植物分类学报 17 (3): 99. 图版 8: 1—2. 1979.

灌木,高1—3米;小枝有纵棱,无毛,或仅在扩大镜下见有微细毛。叶革质或薄革质,披针形、长圆状披针形或狭披针形,稀卵状披针形,长5—12厘米,宽1.5—2.5厘米,先端长渐尖,基部渐狭或楔形,叶面中脉明显,脉上无毛,或近基部被少量微细毛,中脉下方一对较大侧脉,从离叶基1—5毫米处出发上升,成离基三出脉,其余侧脉在叶面稍明显,背面无侧脉,或有1—2对不分明的侧脉;叶柄长10—15毫米。花序腋生兼顶生,总状或近头状以至复总状,长1—1.5厘米,花序轴被微细毛;苞片卵形,长1.5毫米,渐尖头;雄花4—8,生花序轴上半部,雌花2—4,生花序轴下部;雄花:花梗长1毫米,粗壮,具2小苞,小苞阔卵形,长约2毫米,萼片阔卵形或椭圆形,长约3毫米,花丝长5毫米,花药长1毫米;雌花:连柄长3—4毫米,小苞卵形,长约1.5—2毫米,覆瓦状排列,萼片和末档的小苞形状相似。果实球形,直径8毫米,熟时棕色、红色或带紫色,宿存花柱2。花期9月(或继续至翌年3月),果期12月。

产广东(乳源、阳山)、湖南(宜章);生山谷溪边林下,海拔350—800米。模式标本采自广东乳源。

3. 长叶野扇花 图版 14

Sarcococca longifolia M. Cheng et K. F. Wu, 植物分类学报 17 (3): 99. 图版 8: 3. 1979.

灌木,高2米,全株无毛;小枝具纵棱,节间长1.5—2厘米。叶坚纸质,长圆状披针形,长12—16厘米,宽2.5—3.7厘米,先端长渐尖,基部渐狭或急尖,叶面沿中脉两侧的表皮稍隆起,中脉细瘦,下陷,叶脉羽状,两面多少明显,叶面两侧贴近边缘处,各有一条基出纤弱的纵脉(但非离基三出脉);叶柄粗壮,长15—18毫米。花序复总状,长约2厘米;苞片卵形,长1毫米;雄花生花序轴和分枝上,雌花生花序轴近基部,分枝上的雄花,常各3朵,此中位于两侧的,均有长1毫米的花梗,但无小苞;雄花:内萼片阔椭圆形,长3毫米,外萼片略短,阔卵形,常多少呈小舟状,花丝长6毫米,花药长约1毫米;雌花:连柄长4—5毫米,花柱2。果实未见。花期9月(据野外记录)。

产广西容县;生山谷阴处密林下。模式标本采自容县黎村区。

本种和长叶柄野扇花 *S. longipetiolata* M. Cheng 的某些植株相似。但本种小枝完全无毛,叶较长大,非革质,叶脉不相类,花轴光滑,雄花无小苞,得以区别。

4. 云南野扇花 厚叶清香桂(云南植物志) 图版 15: 2—5

Sarcococca wallichii Stapf in Kew Bull. Misc. Inf. 1916: 34; 云南植物志 1: 153, 图版 36, 18—19. 1977.——*S. coriacea* Müll.-Arg. in DC. Prodr.



长叶野扇花 *Sarcococca longifolia* M. Cheng et K. F. Wu: 1.花枝; 2.花序; 3.雄花; 4.雌花。
(何冬泉绘)