

- 空腔,与子房室互生…………… 4. 核椰青属 *Spondias* L.
7. 花瓣覆瓦状排列(有时基部多少近镊合状);花柱 4—5。
8. 花 5 基数。
9. 花两性;花瓣在芽中先端覆瓦状排列,基部镊合状;花柱 5,上半部连合成尖塔形,下半部分离;果扁球形,果核压扁…………… 5. 人面子属 *Dracontomelon* Bl.
9. 花杂性;花瓣覆瓦状排列;花柱 5,分离;果椭圆形,果核与果同形,不压扁……………
- …………… 6. 南酸枣属 *Choerospondias* Burtt et Hill
8. 花 4 基数…………… 7. 厚皮树属 *Lannea* A. Rich.
6. 木质藤本;子房 1 室;胚弯生…………… 8. 藤漆属 *Pegia* Colebr.
5. 心皮 3,子房 1 室。
10. 叶多为羽状复叶,少有掌状 3 小叶和单叶;花托不下凹,不膨大 (3. 漆树族 Trib. *Rhoideae* Engl.)
11. 花为单被花…………… 9. 黄连木属 *Pistacia* L.
11. 花有花萼和花瓣。
12. 单叶;果期不孕花的花梗伸长,被长柔毛…………… 10. 黄栌属 *Cotinus* (Tourn.) Mill.
12. 羽状复叶或掌状 3 小叶;花梗不如上述。
13. 圆锥花序顶生;果被腺毛和具节柔毛或单毛,成熟后红色,外果皮与中果皮连合,内果皮分离…………… 11. 盐肤木属 *Rhus* (Tourn.) L. emend. Moench.
13. 圆锥花序腋生或顶生;果无毛或疏被微柔毛或刺毛,但无腺毛,成熟后黄绿色,外果皮薄,与中果皮分离,中果皮厚,与内果皮连合。
14. 圆锥花序腋生;中果皮蜡质,白色,具褐色树脂道条纹……………
- …………… 12. 漆属 *Toxicodendron* (Tourn.) Mill.
14. 圆锥花序顶生;中果皮为红色胶质…………… 13. 三叶漆属 *Terminthia* Bernh.
10. 单叶;花托膨大,子房埋入下凹的杯状或管状的花托内 (4. 肉托果族 Trib. *Semecarpeae* Engl.)
15. 子房半下位或上位,花柱 3,略叉开…………… 14. 肉托果属 *Semecarpus* L. f.
15. 子房下位,花柱 1…………… 15. 辛果漆属 *Drimycarpus* Hook. f.
1. 矮小灌木或亚灌木状草本;单叶;雌花无花被片,单心皮的雌蕊贴生在大的叶状苞片上 (5. 九子母族 Trib. *Dobineae* Engl.)…………… 16. 九子母属 *Dobinea* Buch.-Ham. ex D. Don

1. 腰果族——Trib. *Anacardieae* Benth. et Hook. f.

Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 418. 1862, p. p.—*Mangiferaeae* L. March. Rev. Anac. 185. 1869, excl. gen. *Solenocarpus*; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 179. 1883, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 144. 1896.

单叶。雄蕊 1 轮或 2 轮或多轮,全育或 1—4 发育;心皮 5、分离或仅 1 个,花柱通常侧生。

本族我国有 3 属。

1. 山棧子属——*Buchanania* Spreng.

Spreng. Schrad. Journ. 2: 234. 1800, nom. conserv., Roxb. Pl.

Corom. 3: 7 et 282. 1820; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 179. 1883,
et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 145. 1896.

乔木或灌木。单叶互生，革质或薄革质，具柄。圆锥花序顶生或腋生；花小，两性，无花梗或具短梗，通常5基数，白色，芳香；花萼小，3—5裂，裂片半圆形，在芽中覆瓦状排列；花瓣通常长圆形，在芽中覆瓦状排列，开花时外卷；雄蕊8—12，着生于花盘基部，花丝线形或钻形，花药长圆状卵形或箭形，药室侧向纵裂；花盘坛状或杯状，厚，具纵槽或有时4—6裂；心皮通常5，分离，常仅1个发育，子房长圆形，1室，1胚珠，花柱短，柱头平截。核果双凸镜状，红色，干后变褐色或黑色，果核坚硬；种子一侧膨大，子叶厚，胚根向上。

约25种，产热带亚洲和大洋洲。我国有4种，分布华南至西南。

分种检索表

1. 花序被微柔毛或绒毛，与叶同出。
 2. 叶两面无毛；花丝钻形，花药箭形……………1. 山欏子 *B. arborescens* (Bl.) Bl.
 2. 叶背面被毛或至少沿中脉上被毛；花丝线形，花药长圆形。
 3. 叶较大，阔长圆形，长12—24厘米，宽6—10厘米，叶背被锈色长柔毛；花萼裂片披针形，外面被锈色柔毛……………2. 豆腐果 *B. latifolia* Roxb.
 3. 叶较小，倒卵形，长4—10厘米，宽2—5厘米，叶两面沿中脉被微柔毛；花萼裂片卵圆形，外面无毛或疏被毛……………3. 小叶山欏子 *B. microphylla* Engl.
1. 花序无毛，先叶开放；花丝钻形，花药箭形……………4. 云南山欏子 *B. yunnanensis* C. Y. Wu

1. 山欏子(台湾)

Buchanania arborescens (Bl.) Bl. Mus. Bot. 1: 183. 1850; Hayata, Ic. Pl. Form. 1: 164. 1911; Craib, Fl. Siam. Enum. 1 (2): 384. 1926; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 362, f. 318. 1936; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 76. 1962; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 445, f. 172. 1963, et Fl. Taiw. 3: 565. 1977. — *Coniogeton arborescens* Bl. Bidr. 1159. 1826. — *Buchanania florida* Schauer in Nov. Act. Cur. 19, Supp. 1: 481. 1843; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 9. 1908. — *B. florida* var. *arborescens* Pierre, Fl. For. Cochinch. 5: pl. 381. 1898. — *B. florida* var. *dongnaiensis* Pierre, l. c. 5: pl. 372B. 1898.

常绿乔木；小枝圆柱形，疏被黄色微柔毛或近无毛。叶革质，倒卵状长圆形或倒卵状椭圆形，长8—18厘米，宽4—6厘米，先端圆形，基部楔形，全缘，两面无毛，侧脉纤细，10—15对，侧脉和细脉两面突起；叶柄长2—2.5厘米。圆锥花序顶生或生于上部叶腋，长8—10厘米，被锈色微柔毛；花白色；花萼无毛，裂片近圆形，边缘具睫毛；花瓣椭圆形或近圆形，长3—4毫米，肉质；雄蕊与花瓣等长，花丝线状钻形，比花药略长，花药箭形；花盘