

大而厚；心皮5，被微柔毛。核果卵形，双凸镜状，径约8毫米，无毛。

产我国台湾南部海岸边(高雄)。分布于印度、中南半岛、印度尼西亚(爪哇)至菲律宾。

2. 豆腐果(云南植物志) 天干果(云南元江) 图版 23: 1—3

Buchanania latifolia Roxb. Hort. Beng. 32. 1814, nom. nud., et Fl. Ind. 2: 385. 1832, descr.; Wight et Arn. Prodr. 1: 169. 1834; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 23. 1876; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 182. 1883, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 145. 1896; Pierre, Fl. For. Cochinch. 5: pl. 370B. 1898; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 10. 1908; Craib, Fl. Siam. Enum. 1 (2): 348. 1926; Merr. et Chun in Sunyats. 2: 264. 1935; 陈嵘, 中国树木分类学 653, 图 545. 1937; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 77. 1962; 海南植物志 3: 101, 图 596. 1974; 云南植物志 2: 364, 图版 112, 1—3. 1979.

落叶乔木，高13—15米；树皮纵皱，小枝粗壮，暗褐色，具圆形突起皮孔，被锈色微绒毛，后变无毛或近无毛。叶革质，阔长圆形，长12—24厘米，宽6—10厘米，先端圆形或微凹，基部圆形或阔楔形，全缘，略背卷，幼叶密被锈色长柔毛，叶面后变无毛，叶背被锈色长柔毛，侧脉12—20对，斜升，近边缘处网结，侧脉和网脉在叶面微凹，叶背明显突起；叶柄长1.5—2.2厘米，被长柔毛。圆锥花序顶生，密被锈色绒毛，长达20厘米，花序轴和总梗粗壮；花白色，径约2.5毫米，花无梗；花萼5裂，裂片披针形，长约1.5毫米，外面被锈色柔毛，边缘具睫毛；花瓣5，长圆形，长约2.5毫米，宽约1.5毫米，先端略外卷，无毛；雄蕊10，花丝线形，长约1.2毫米，无毛，花药长圆形，长约0.5毫米；心皮5—6，分离，仅1个发育，不育心皮呈线状外弯，子房圆锥状，长约1毫米，密被锈色绒毛，花柱长约0.5毫米，无毛。核果双凸镜状，径约9毫米，厚约6毫米，成熟时变黑色，被微柔毛或近无毛。


产云南(南部)、广东(海南)；生于海拔120—900米的沟谷疏林中。分布于越南、老挝、泰国、缅甸、马来西亚和印度。

木材质轻，不耐腐，宜作箱板和家俱。种子可磨豆腐，故得其名。

3. 小叶山欏子 山马耳、赤南(海南)

Buchanania microphylla Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 185. 1883; Merr. et Chun in Sunyats. 5: 105. 1940; 海南植物志 3: 102. 1974.

乔木，高5—9米；幼枝被锈色微柔毛，后变无毛。叶革质，倒卵形，长4—10厘米，宽2—5厘米，先端圆形或微凹，基部圆形至阔楔形，全缘而背卷，无毛，叶面具光泽，两面沿中脉被微柔毛，侧脉12—20对，侧脉和网脉两面突起；叶柄长8—14毫米，被微柔毛。圆锥花序顶生，密被锈色微柔毛，多分枝；花淡黄色，花梗短，长约1毫米，被微柔毛；花萼5裂，裂片卵圆形，长约1毫米，外面疏被毛或近无毛；花瓣长圆形，长约2.5毫米，宽约1毫



1—3.豆腐果 *Buchanania latifolia* Roxb.: 1.花枝; 2.花(去花瓣和雄蕊); 3.雄蕊。4—6.云南山楤
子 *Buchanania yunnanensis* C. Y. Wu; 4.花枝, 5.花(去花瓣及雄蕊), 6.雄蕊。(李锡畴绘)