

米,无毛,开花时外卷;雄蕊 10,花丝线形,长约 1 毫米,花药长圆形,比花丝短,长约 0.5 毫米;花盘无毛;子房圆锥形,长约 0.5 毫米,密被粗硬毛。幼果双凸镜状,无毛。

产广东(海南);生于山坡或沟谷林中。菲律宾亦有分布。

近于 *B. reticulata* Hance, 但叶较小,倒卵形,花明显具梗,花萼无毛或近无毛,花盘无毛而不同。

#### 4. 云南山欒子(云南植物志) 图版 23: 4—6

*Buchanania yunnanensis* C. Y. Wu, 云南植物志 2: 364, 图版 112, 4—6. 1979.

落叶乔木,高约 5 米;小枝灰褐色,无毛,具圆形大叶痕和突起的小皮孔。叶未见。圆锥花序顶生,先叶开放,长 11—20 厘米,无毛,分枝长 2—6 厘米,花序轴和总梗粗壮;花黄绿色,无花梗;花萼无毛,裂片近圆形,径约 1.5 毫米;花瓣长卵形,长约 3 毫米,宽约 2 毫米,无毛,开花时外卷;雄蕊 10,花丝钻形,下部宽,上部渐狭,长约 1.5 毫米,无毛,花药箭形,基部略叉开,长约 0.8 毫米;花盘无毛;心皮 5,分离,无毛。果未见。

产云南景洪;生于海拔 1060 米路旁灌丛中。模式标本采自景洪。

近于 *B. lucida* Bl. 但为落叶乔木,先花后叶,花黄绿色,密集排列,无花梗而不同。

## 2. 腰果属——*Anacardium* (L.) Rottboell

[L. Sp. Pl. 1: 383. 1753] Rottboell in Act. Hafn. 2: 252.

1775; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 420. 1862; Engl. in DC.

Monog. Phan. 4: 215. 1883, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflan-

zenfam. 3 (5): 147. 1896.

灌木或乔木。单叶互生,革质,全缘,无柄或具柄。圆锥花序顶生,多分枝,略呈伞房状;具苞片;花小,杂性或雌雄异株;花萼 5 深裂,裂片在芽中覆瓦状排列;花瓣 5,芽中覆瓦状排列,开花时外卷;雄蕊 8—10,不等长,通常仅 1 个发育,花丝线形,基部多少合生或与伸长的花托合生,花药阔椭圆形,丁字着生,侧向纵裂;子房无柄,略不对称,压扁,1 室,1 胚珠,花柱通常侧生,线形。核果肾形,侧向压扁,种脐于内弯处,果期花托肉质膨大而成棒状或梨形(有时极大)的假果,托于果的下部;种子肾形,直立。

约 15 种,主产热带美洲,其中 1 种全球热带广为栽培,我国云南、广西、广东、福建等省区有少量引种。

### 1. 腰果 鸡腰果,欒如树

*Anacardium occidentale* L. Sp. Pl. 1: 383. 1753; DC. Prodr. 2: 62. 1825; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 20. 1876; Kurz, For. Fl. Brit. Burm. 1: 310. 1877; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 219. 1883, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 147, f. 94. A—B. 1896; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 12.