

沟谷林中。分布于越南、柬埔寨、泰国、缅甸、马来西亚、斯里兰卡、印度、锡金、菲律宾和印度尼西亚(爪哇)。

果和幼叶可食。树皮可提栲胶。

3. 岭南酸枣(广州植物志) 假酸枣

Spondias lakonensis Pierre, Fl. For. Cochinch. 5: pl. 375. 1898; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 9. 1908; Airy-Shaw et Forman in Kew Bull. 21 (1); 13, pl. 2, 9—10. 1967; 云南植物志 2: 374. 1979.——*Allospodias lakonensis* (Pierre) Stapf in Hook. Ic. Pl. 27, pl. 2667. 1900; Craib, Fl. Siam. Enum. 1 (2); 375. 1926; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 15: 422. 1936; 广州植物志 449, 图 243. 1956; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 130, pl. 7, 3—10. 1962; 中国高等植物图鉴 2: 637, 图 3003. 1972; 海南植物志 3: 105, 图 601. 1974——*Poupartia chinensis* Merr. in Philipp. Journ. Sci. 15: 245. 1919.——*Spondias chinensis* (Merr.) Metc. in Journ. Arn. Arb. 12: 270. 1931; 陈嵘, 中国树木分类学 648. 1937.

3a. 岭南酸枣(原变种)

var. *lakonensis*

落叶乔木, 高 8—15 米; 小枝灰褐色, 疏被微柔毛, 粗 4—6 毫米。叶互生, 奇数羽状复叶长 25—35 厘米, 有小叶 5—11 对, 叶轴和叶柄圆柱形, 疏被微柔毛; 小叶对生或互生, 长圆形或长圆状披针形, 长 6—10 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端渐尖, 基部明显偏斜, 阔楔形至圆形, 全缘, 幼叶叶面疏被微柔毛, 后变无毛, 叶背脉上或脉腋被微柔毛, 叶面干后变暗褐色, 侧脉 8—10 对, 斜升, 近边缘处弧形弯曲, 不形成边缘脉; 小叶柄短, 长约 2 毫米, 被微柔毛。圆锥花序腋生, 长 15—25 厘米, 被灰褐色微柔毛, 分枝疏散; 苞片小, 钻形或卵形, 长 0.5—1 毫米, 被微柔毛; 花小, 白色, 密集于花枝顶端; 花梗纤细, 长 2.5—3.5 毫米, 近基部有关节, 被微柔毛; 花萼被微柔毛, 长约 0.6 毫米, 近中部 5 齿裂, 裂片三角形, 先端钝; 花瓣长圆形或卵状长圆形, 长约 2.5 毫米, 宽约 1 毫米, 无毛, 具 3 脉, 开花时花瓣下倾, 先端和边缘内卷; 雄蕊 8—10, 花丝线形, 长约 2.5 毫米, 与花瓣等长, 花药长圆形, 长约 1 毫米; 花盘无毛, 边缘波状; 心皮 4, 稀 5, 合生, 子房 4(—5) 室, 花柱 1, 无毛。核果倒卵状或卵状正方形, 长 8—10 毫米, 宽 6—7 毫米, 成熟时带红色, 中果皮肉质, 味甜可食, 果核木质, 近正方形, 4 个侧面略凹, 顶端具 4 角和 4 个凹点, 横切面近正方形, 子房室与薄壁组织腔互生, 每室具 1 种子; 种子长圆形, 种皮膜质。

产广西、广东(海南)、福建; 生于向阳山坡疏林中。分布于越南、老挝、泰国。

果酸甜可食, 有酒香。种子榨油可作肥皂。木材软而轻, 但不耐腐, 适作家俱、箱板等。又可作庭园绿化树种。

3b. 毛叶岭南酸枣(变种) 图版 25: 3—6