

形,径约1毫米,无毛,花柱5,侧生,长约0.5毫米。核果椭圆形,偏斜,略压扁,长约10毫米,宽约8毫米,成熟时黑色;种子长圆形,压扁。

产云南(西南至东南部)、贵州(册亨)、广西(平果、田林);生于海拔(240—)500—1750米的沟谷林中。分布于尼泊尔、锡金、印度、缅甸和泰国。

## 2. 利黄藤(广西) 泌脂藤、脉果漆(广西植物名录)

*Pegia sarmentosa* (Lect.) Hand.-Mazz. in *Sinensia* 3: 187. 1933, et in l. c. 5; 2. 1934; Tard.-Blot in *Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn.* 2: 153, pl. 9, 1—3. 1962; 云南植物志 2: 382. 1979.——*Phlebochiton sarmentosum* Lecte. in *Bull. Soc. Bot. Franc.* 54: 528. 1907, et *Fl. Gén. Indo-Chine.* 2: 32. [1908.——*Pegia bijuga* Hand.-Mazz. in *Sinensia* 3: 186. 1933.——*Phlebochiton sinense* Diels in *Sunyats.* 1: 123. 1933.

攀援状木质藤本;小枝紫褐色,无毛或近无毛。奇数羽状复叶长15—30厘米,有小叶5—7对,叶轴和叶柄上面具槽,被卷曲黄色微柔毛,下面无毛;小叶对生,薄纸质,长圆形或椭圆状长圆形,长4—9.5厘米,宽1.5—4厘米,先端渐尖或急尖,基部近心形,边缘上半部具疏离钝齿或近全缘,叶面具灰白色细小乳突体,中脉被卷曲黄色微柔毛,叶背脉腋具灰黄色髯毛,其余无毛或近无毛,侧脉6—8对,侧脉和细脉在叶背突起;小叶柄长3—8毫米。圆锥花序长8—20厘米或更长,分枝疏散而纤细,被稀疏平展微柔毛;小苞片小,钻形,长约1毫米,外面和边缘被毛;花梗长1—1.5毫米,无毛;花萼无毛,裂片三角形,长约0.8毫米;花瓣卵形或卵状椭圆形,长约1.5毫米,无毛;雄蕊短,长约0.7毫米,花丝钻形,花药小,卵圆形;花盘无毛;子房球形,径约1毫米,无毛,花柱侧生,长约0.5毫米,柱头盾状。核果椭圆形或卵圆形,长10—15毫米,宽8—10毫米,无毛,压扁;种子长圆形。

产云南(东南部)、贵州(东南部)、广西、广东;喜生于石山灌丛或密林中。分布于越南、老挝、印度尼西亚加里曼丹岛。

## 3. 漆树族——Trib. Rhoideae Engl.

Engl. in *DC. Monog. Phan.* 4: 176. 1883, et in *Engl. u.*

Prantl, *Nat. Pflanzenfam.* 3 (5): 154. 1896.

单叶,掌状3小叶或奇数羽状复叶。雄蕊1—2轮;心皮3,稀1,花柱顶生或侧生,分离或合生,子房1室,稀2—3室,胚珠基生或室顶悬垂。核果具1种子;胚弯生,稀直立。

本族我国有5属。

## 9. 黄连木属——*Pistacia* L.

*L. Gen. Pl.* 1108. 1754; *DC. Prodr.* 2: 64. 1825; *Benth. et*