

Arb. 7: 196. 1926, p. p.; A. Penzès, 植物学报 7 (3): 168, pl. 4, f. 8. 1958; 中国高等植物图鉴 2: 640, 图 3009, 1972.

叶多为阔椭圆形, 稀圆形, 叶背、尤其沿脉上和叶柄密被柔毛; 花序无毛或近无毛而与前一变种相区别。

产贵州、四川、甘肃、陕西、山西、山东、河南、湖北、江苏、浙江; 生于海拔 800—1500 米的山坡林中。间断分布于欧洲东南部, 经叙利亚至苏联(高加索)。

1d. 粉背黄栌(变种)

var. *glaucophylla* C. Y. Wu 云南植物志 2: 386. 1979——*C. coggygia* auct. non Scop.; Diels in Bot. Jahrb. 29: 432. 1900, et l. c. 36 (82): 71. 1905, Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 635. 1933; 中国高等植物图鉴 2: 639, 图 3008. 1972, p. p.——*C. coggygia* Scop. var. *laevis* auct. non (Wall.) Engl.; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. 17: 416. 1910.——*C. coggygia* Scop. var. *pubescens* auct. non Engl.; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 175. 1914, p. p.; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 196. 1926, p. p.

叶卵圆形, 较大, 长 3.5—10 厘米, 宽 2.5—7.5 厘米, 无毛, 但叶背显著被白粉; 叶柄较长, 1.5—3.3 厘米, 与欧洲产的原变种显著不同。

产云南、四川、甘肃、陕西; 生于海拔 1620—2400 米的山坡或沟边灌丛中。模式标本采自云南中甸。

2. 四川黄栌(植物学报)

Cotinus szechuanensis A. Penzès, 植物学报 7(3): 169, pl. 4. f. 9. 1958.

灌木, 高 2—5 米; 小枝圆柱形, 灰褐色, 无毛。叶互生, 薄纸质, 近圆形或阔卵形, 长 2—6 厘米, 宽 2—5 厘米, 先端圆形, 稍微凹或略急尖, 基部圆形, 叶面无毛, 叶背脉腋显著具髯毛, 侧脉在叶背突起; 叶柄纤细, 长 1—3 厘米, 无毛。圆锥花序顶生, 分枝纤细, 无毛; 花梗长 3—4 毫米, 花后不孕花花梗伸长, 被淡紫色长柔毛; 花萼无毛, 裂片卵状三角形, 长约 1 毫米; 花瓣椭圆状长圆形, 长约 1.5 毫米, 无毛; 在雌花中雄蕊较短, 花药卵形; 花盘无毛; 子房肾形, 无毛, 径约 0.7 毫米, 略压扁, 花柱 3, 偏于一侧。核果肾形, 长约 4.5 毫米, 宽约 3 毫米, 外果皮无毛, 具脉纹。

产四川(西北部); 生于海拔 800—1900 米的山坡草地或杂木林中。模式标本采自四川理县。

3. 矮黄栌(云南植物志) 图版 28: 7—9

Cotinus nana W. W. Smith in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 9: 101. 1916; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 635. 1933; 云南植物志 2: 387, 图版 117, 7—9. 1979.

矮小灌木, 高 0.5—1.5 米; 小枝圆柱形, 幼枝紫褐色, 无毛。叶互生, 较小, 革质, 圆形