

或卵圆形，长和宽1—2厘米，先端圆形，基部圆形或近楔形，全缘，两面无毛，叶背被白粉，侧脉和细脉在叶面突起；叶柄纤细，长3—6毫米。圆锥花序顶生，多分枝，被腺状疏柔毛；苞片披针形，长1.5—3毫米；花小，单性或杂性，粉红色，径约3毫米；花梗纤细，长6—8毫米，被腺状疏柔毛；花萼5裂，紫红色，裂片卵状三角形，长约1毫米，先端急尖或钝，近基部疏被微柔毛或无毛，边缘具细睫毛；花瓣长圆形或长圆状椭圆形，长2—2.5毫米，具紫红色脉纹，无毛；雄蕊长约1.5毫米，花丝线形，比花药略长，约0.9毫米，花药卵状长圆形，在雌花中不育雄蕊较小；花盘无毛；子房偏斜，近球形，径约0.7毫米，疏被微柔毛，花柱3，柱头近头状。核果近肾形，长3—4毫米，宽2.5—3毫米，压扁，褐色，疏被微柔毛。

产云南西北部；生于海拔1560—2500米的石山灌丛中。模式标本采自云南丽江。

### 11. 盐肤木属——*Rhus* (Tourn.) L. emend. Moench

[Tourn. Inst. Rei. Herb. 611. 1700] L. Sp. Pl. 1: 265. 1753, p. p., et Gen. Pl. ed. 5, 129. 1754, excl. *Toxicodendron* and *Cotinus*; Moench, Meth. 72. 1794; DC. Prodr. 2: 67. 1825, sect. *Sumac* p. p.; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 376. 1883, sect. *Trichocarpace* excl. *R. trichocarpa* et *potentillaefolia*, et in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5), 168. 1896, sect. *Trichocarpace* excl. *R. trichocarpa*; F. A. Barkley in Ann. Miss. Bot. Gard. 24: 313. 1937.

落叶灌木或乔木。叶互生，奇数羽状复叶、3小叶或单叶，叶轴具翅或无翅；小叶具柄或无柄，边缘具齿或全缘。花小，杂性或单性异株，多花，排列成顶生聚伞圆锥花序或复穗状花序；苞片宿存或脱落；花萼5裂，裂片覆瓦状排列，宿存；花瓣5，覆瓦状排列；雄蕊5，着生在花盘基部，在雄花中伸出，花药卵圆形，背着药，内向纵裂；花盘环状；子房无柄，1室，1胚珠，花柱3，基部多少合生。核果球形，略压扁，被腺毛和具节毛或单毛，成熟时红色，外果皮与中果皮连合，中果皮非蜡质。

约250种，分布于亚热带和暖温带，我国有6种，除东北、内蒙古、青海和新疆外均有分布。

本属均可作五倍子蚜虫寄主植物，但以盐肤木上的虫瘿较好，称“角倍”，其余称“肚倍”，质量较次。

### 分种检索表

1. 小叶边缘具粗锯齿，叶片较大，长6—12厘米，宽3—7厘米…………… 1. 盐肤木 *R. chinensis* Mill.
1. 小叶全缘或稀有小锯齿。

## 2. 叶轴具宽的叶状翅。

3. 小叶卵形或长圆形, 先端圆形, 叶面被糙伏毛, 叶背被硬毛, 无点, 具细小乳突体…………… 2. 川麸杨 *R. wilsonii* Hemsl.

3. 小叶披针形, 先端急尖或微凹, 叶面具稀疏腺乳突体, 沿中脉被微柔毛, 叶背具密布不显的棕黄色斑点和极稀疏腺乳突体, 沿中脉上被糙伏毛…………… 3. 滇麸杨 *R. teniana* Hand.-Mazz.

## 2. 叶轴无翅或稀上部具极狭的翅。

4. 小叶4—8对, 叶背被白色绢状微绒毛…………… 4. 白背麸杨 *R. hypoleuca* Champ. ex Benth.

4. 小叶3—6对, 叶背通常仅脉上被毛, 毛被不如上述。

5. 小枝被微柔毛; 小叶3—6对, 卵状长圆形或长圆形, 先端渐尖或长渐尖, 基部圆形或近心形, 叶背常变红色, 被微柔毛, 无柄…………… 5. 旁遮普麸杨 *R. punjabensis* Stewart

5. 小枝无毛; 小叶3—5对, 长圆形或长圆状披针形, 先端渐尖, 基部阔楔形至圆形, 叶背绿色, 沿中脉被稀疏微柔毛或无毛, 明显具小叶柄…………… 6. 青麸杨 *R. potaninii* Maxim.

1. 盐肤木(正字通) 五倍子树(通称), 五倍柴(湖南), 五倍子(四川、湖南), 山梧桐(辽宁), 木五倍子(四川), 乌桃叶、乌盐泡、乌烟桃(武汉), 乌酸桃、红叶桃、盐树根(浙江), 土楮树、酸酱头(山东), 红盐果、倍子柴(江西), 角倍(四川), 肤杨树(湖南), 盐肤子(开室本草、图考), 盐酸白(广东、福建)

*Rhus chinensis* Mill. Gard. Dict. ed. 8, 7. 1768; Merr. in Contr. Arn. Arb. 8: 91. 1934; Merr. et Metc. in Lingn. Sci. Journ. 16 (3): 393. 1937; J. Ohwi, Fl. Jap. 729. 1956; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 182. 1962; 中国高等植物图鉴 2: 632, 图 2994. 1972; 海南植物志 3: 109. 1974; 云南植物志 2: 388. 1979.——*Schinus indicus* Burm. Fl. Ind. 215. 1768.——*Rhus semialata* Murr. in Comm. Doc. Goetting. 6: 27, t. 23. 1784; DC. Prodr. 2: 67. 1825; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 380. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 146. 1886; Engl. in Bot. Jahrb. 29: 433. 1901; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 635. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 646, 图 539. 1937.——*R. semialata* var. *osbeckii* DC. Prodr. 2: 67. 1825; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 380. 1883; Schirasawa, Ic. Ess. For. Jap. 1: 96, t. 58, f. 18—34. 1900.——*R. osbeckii* Decaisne ex Steud. Nom. Bot. ed. 2, 2: 452. 1841; Schneid. Ill. Handb. Laubholz. 2: 156, f. 102, d. 1907.——*R. javanica* auct. non L.; Thunb. Fl. Jap. 121. 1785; Lour. Fl. Cochinch. 183. 1790; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 178. 1914; Bl. in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 14: 383. 1924, et l. c. 17: 171. 1930; Craib, Fl. Siam. Enum. 1 (2): 342. 1926.

## 1a. 盐肤木(原变种)

var. *chinensis*

落叶小乔木或灌木, 高2—10米, 小枝棕褐色, 被锈色柔毛, 具圆形小皮孔。奇数羽状复叶有小叶(2—)3—6对, 叶轴具宽的叶状翅, 小叶自下而上逐渐增大, 叶轴和叶柄密被