

灌木,高1—4米;小枝枣红色,圆柱形,具条纹,幼枝密被灰黄色柔毛。奇数羽状复叶长10—20厘米,有小叶5—9(—13)对,叶轴具叶状翅,宽2—4毫米,每对小叶间距2—4厘米,叶轴和叶柄被微硬毛和柔毛,叶柄短,长1—2厘米;小叶卵形或长圆形,长2—6厘米,宽0.8—2厘米,先端圆形,具小尖头,稀急尖或微凹,基部不对称,楔形或略成圆形,全缘或极稀具稀疏锯齿,叶面被糙伏毛,叶背粉绿色,被微硬毛,无点,具细小乳突体,中脉和侧脉在叶面微凹,在叶背明显突起;小叶无柄或近无柄。圆锥花序顶生或近顶生,长3—10厘米,密被灰白色柔毛;苞片披针形,长1—3毫米,小苞片小,被毛;花淡黄色,径约3毫米;花梗长1—3毫米,被柔毛;花萼裂片三角状卵形,先端圆形,长约1毫米,无毛或被稀疏腺毛,边缘具稀疏细睫毛;花瓣卵状长圆形,长约2毫米,先端圆形,具褐色羽状脉,里面中下部具白色髯毛;在雌花中雄蕊长约1毫米,花丝与花药等长,无毛,花药卵形;花盘波状5浅裂,无毛;子房被柔毛,花柱3,无毛。果近球形,略压扁,径约4毫米,被具节柔毛和腺毛,成熟时红色。花期4—6月,果期9—10月。

产云南(东北部)和四川(西南部);生于海拔350—1300(—2300)米的石灰山灌丛中。模式标本采自四川西南部。

3. 滇欒杨(云南植物志)

Rhus teniana Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 637. 1933; 云南植物志 2: 389. 1979.

灌木,高1—3米;小枝淡枣红色,被灰白色微柔毛,后变无毛,具稀疏黄色小皮孔。奇数羽状复叶长11—19厘米,有小叶7对,叶轴具叶状翅,宽4—6毫米,每对小叶间距1.8—2厘米;小叶薄纸质,互生或近对生,披针形,长2.5—6厘米,宽0.8—1.6厘米,先端急尖或微凹,基部偏斜,阔楔形或近圆形,全缘,叶面具稀疏腺乳突体,沿中脉被微柔毛,叶背粉绿色,具密而不显的棕黄色斑点和极稀疏腺乳突体,沿中脉被糙伏毛,侧脉密而近平行,11—14对,中侧脉在叶面平,在叶背突起;小叶无柄。圆锥花序顶生,长约3厘米,花序轴及分枝被灰色微绒毛;苞片披针形,小苞片小,无毛;花黄白色,花梗长1—2毫米,被微绒毛;花萼外面近基部疏被柔毛,裂片三角状卵形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花瓣卵状长圆形,长约2毫米,先端圆形,里面沿中脉被糙伏毛;在雌花中雄蕊较短,长约1毫米,花丝压扁,与花药等长;花盘无毛;子房密被白色柔毛,花柱3。果未见。

产云南西北部;生于海拔1900米的沟边灌丛中。模式标本采自云南大姚。

相近种川欒杨 *Rhus wilsonii* Hemsl. 其小叶表面被糙伏毛,叶背被硬毛,无点,具稀疏细小的腺乳突而与本种不同。

4. 白背欒杨

Rhus hypoleuca Champ. ex Benth. in Hook. Kew Journ. Bot. 4: 43. 1852; Benth. Fl. Hongk. 69. 1861; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 378. 1883; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 448. 1963, et in Fl. Taiw. 3: 569. 1977.