

卷;花丝线形,长约2毫米,中下部被微柔毛,在雌花中较短,长约1毫米,花药卵形;花盘厚,紫红色,无毛;子房球形,密被白色柔毛,径约1毫米,雄花中有不育子房。核果近球形,略压扁,径约4毫米,成熟时暗紫红色,被具节柔毛和腺毛;种子小。

产云南(东北至西北部)、贵州、湖南、湖北、陕西、甘肃、四川、西藏;生于海拔460—3000米的石灰山灌丛或密林中。模式标本采自湖北宜昌。

木材白色,质坚,可作家俱和农具用材。

5c. 毛叶欏杨(变种)

var. *pilosa* Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 378. 1883; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 635. 1933; 云南植物志 2: 392. 1979.

与上一变种的区别是:小枝、叶轴、叶柄和小叶背面均密被柔毛,叶轴无翅。

产云南西北部、四川西部和西藏东南部;生于海拔2000—3500米的高山峡谷或沟谷杂木林中。分布于克什米尔地区。

6. 青欏杨(中国树木分类学) 五倍子(陕西), 倍子树(贵州) 图版29: 7

Rhus potaninii Maxim. in Act. Hort. Petrop. 11: 110. 1889; Bretschneider, Hist. Eur. Bot. Discov. China 1027. 1898; Pax. ex Diels in Bot. Jahrb. 29: 432. 1900, et l. c. 36 (82): 71. 1905; Pamp. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. n. ser. 17: 416. 1910; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 177. 1914; Hers in Journ. N. China Branch. R. As. Soc. 53: 115. 1922; Listc. Ess. Lign. Honan Sept. 26. 1922; Chung in Mem. Sci. Soc. China 1: 177. 1924; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 197. 1926; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 635. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 647. 1937; 中国高等植物图鉴 2: 633, 图 2996. 1972.——*R. henryi* Diels in Bot. Jahrb. 29: 432. 1900.——*R. sinica* Koehne in Mitteil. Deutsch. Dendr. Ges. 191: 102, f. 5. 1910; Schneid. Ill. Handb. Laubholzk. 2: 1022. 1912.

落叶乔木,高5—8米;树皮灰褐色,小枝无毛。奇数羽状复叶有小叶3—5对,叶轴无翅,被微柔毛;小叶卵状长圆形或长圆状披针形,长5—10厘米,宽2—4厘米,先端渐尖,基部多少偏斜,近圆形,全缘,两面沿中脉被微柔毛或近无毛;小叶具短柄。圆锥花序长10—20厘米,被微柔毛;苞片钻形,长约1毫米,被微柔毛;花白色,径2.5—3毫米;花梗长约1毫米,被微柔毛;花萼外面被微柔毛,裂片卵形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花瓣卵形或卵状长圆形,长1.5—2毫米,宽约1毫米,两面被微柔毛,边缘具细睫毛,开花时先端外卷;花丝线形,长约2毫米,在雌花中较短,花药卵形;花盘厚,无毛;子房球形,径约0.7毫米,密被白色绒毛。核果近球形,略压扁,径3—4毫米,密被具节柔毛和腺毛,成熟时红色。

产云南、四川、甘肃、陕西、山西、河南;生于海拔900—2500米的山坡疏林或灌木中。