

具光泽,果梗粗壮,长约2毫米。

产四川西南部;生于海拔1400米的石灰山上。模式标本采自四川会理。

近于小漆树 *T. delavayi* (Franch.) F. A. Barkl., 但各部密被黄色微硬毛而不同。

7. 云南漆(云南植物志) 图版33: 1—4

Toxicodendron yunnanense C. Y. Wu 云南植物志 2: 401. 图版 121, 1—4. 1979, p. p. quoad specim. S. C. Huang 168 et H. T. Tsai 53503.

7a. 云南漆(原变种)

var. **yunnanense**

小灌木,高1—1.5米;幼枝红褐色,被黄色柔毛;顶芽密被黄色绒毛。奇数羽状复叶互生,长8—23厘米,有小叶3—4对,叶轴上部具条纹或极狭的翅,叶轴和叶柄被黄色柔毛;叶柄长3—8.5厘米;小叶对生,纸质,卵状披针形或椭圆状披针形,自下而上逐渐增大,长3.5—8.5厘米,宽1.2—3.8厘米,顶生小叶长达10.5厘米,先端长渐尖或尾状渐尖,基部偏斜,阔楔形至圆形,边缘有波状圆齿,具缘毛,两面被黄色柔毛,脉上较密,侧脉两面突起;小叶柄极短或近无柄。小聚伞花序组成的总状花序长3—9.5厘米,比叶短,被黄色柔毛,总梗纤细而长;苞片披针形,被柔毛;花白色;花梗长约2毫米,被黄色柔毛;花萼无毛,裂片卵形,长约0.7毫米,先端钝;花瓣长圆形,长约2毫米,先端钝,无毛,具褐色羽状脉;雄蕊比花瓣短,花丝长约0.5毫米,花药长圆形,长约1.2毫米;花盘5浅裂,无毛;子房球形,径约0.5毫米。幼果斜卵形,压扁,先端偏于一侧,长4—5毫米,宽5—6毫米,外果皮无毛,具光泽。

产云南中部;生于海拔1650—2200米的沟谷林中。模式标本采自云南双柏。

近于小漆树 *T. delavayi* (Franch.) F. A. Barkl., 但各部被黄色柔毛,小叶边缘具波状圆齿,被缘毛,先端长渐尖或尾状渐尖,小叶片自下而上逐渐增大而不同。

7b. 长序云南漆 图版34: 1—3


var. **longipaniculatum** C. Y. Wu et T. L. Ming, var. nov. in Addenda 140.—*Toxicodendron yunnanense* C. Y. Wu 云南植物志 2: 401. 1979, p. p. excl. specim. S. C. Huang 168 et H. T. Tsai 53503.

这一变种与原变种的区别是小叶3—5(—10)对,狭披针形,全缘,花序长达21厘米。

产四川(西南部)和云南(中部);生于海拔400—2200米。模式标本采自四川雷波。

8. 毛漆树(中国树木分类学)

Toxicodendron trichocarpum (Miq.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. 154. 1891; I. Linzevski in Komarov, Fl. URSS. 14: 538. 1949.—*Rhus trichocarpa* Miq. in Ann. Mus. Lugd.-Bat. 2: 84. 1866; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 379. 1883; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. 23: 148. 1886; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 180. 1914; Rehd. in Journ. Arn. Arb. 8: 155. 1927, et l. c.



1—4. 云南漆 *Toxicodendron yunnanense* C. Y. Wu: 1. 花枝; 2. 花; 3. 花 (去花萼和花瓣); 4. 幼果。5—9. 大花漆 *Toxicodendron grandiflorum* C. Y. Wu et T. L. Ming: 5. 花枝; 6. 花; 7. 花 (去花萼和花瓣); 8. 花瓣; 9. 果。(李锡畴绘)