

本种介于野漆 *T. succedaneum* (L.) O. Kuntze 和小漆树 *T. delavayi* (Franch.) F. A. Barkl. 二种之间, 与前者区别是, 小叶纸质, 较薄, 倒卵形或倒卵状长圆形, 花序与叶等长, 疏花, 花大, 花瓣具明显褐色羽状脉, 开花时不外卷。与后者区别是, 乔木和灌木, 小叶先端渐尖, 全缘, 小叶多达 7 对, 花序圆锥状, 花较大。

12b. 长梗大花漆(变种)

var. *longipes* (Franch.) C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 2: 405. 1979. — *Rhus succedanea* var. *longipes* Franch. Pl. Delav. 148. 1889.

小叶披针形, 柄长 1—1.5 厘米而与原变种相区别。

产云南(西北部)和四川(西南部); 生于海拔 700—2500 米的灌丛中。模式标本采自云南鹤庆。

13. 石山漆(云南植物志) 图版 35: 1

*Toxicodendron calcicolum* C. Y. Wu, 云南植物志 2: 405, 图版 122, 1. 1979.

灌木或小乔木, 高 3—7 米; 树皮灰褐色, 具皮孔, 幼枝紫红色, 无毛, 被白粉, 顶芽外面无毛。奇数羽状复叶常集生于枝顶, 长 15—25 厘米, 有小叶 3—4 对, 无毛, 叶轴和叶柄圆柱形, 纤细; 叶柄长 3.5—8 厘米; 小叶对生, 膜质, 镰状披针形, 长 4—8.5 厘米, 宽 1—3.5 厘米, 先端渐尖, 多少弯曲, 具细尖头, 基部偏斜, 圆形至阔楔形, 全缘或上部具疏齿, 两面无毛, 叶背灰绿色, 侧脉 12—18 对, 两面略显, 小叶无柄或近无柄。圆锥花序长 12—18 厘米, 与叶近等长, 无毛, 多分枝, 序轴及分枝纤细; 苞片披针形, 长约 2 毫米; 花梗长约 3 毫米; 花萼无毛, 裂片卵形, 长约 0.7 毫米, 先端钝; 花瓣长圆形, 具褐色羽状脉纹, 两端钝; 花药卵状长圆形; 花盘 5 裂; 子房无毛。果未见。

产云南东南部; 生于海拔 1500 米的石灰山林下。模式标本采自云南西畴。

近于小漆树 *T. delavayi* (Franch.) F. A. Barkl., 但小叶膜质, 镰状披针形, 具细尖头, 花序多分枝, 圆锥状而不同。

14. 小漆树(云南植物志) 山漆树(中国树木分类学, 中国高等植物图鉴)

*Toxicodendron delavayi* (Franch.) F. A. Barkl. in Ann. Midl. Nat. 24: 680. 1940, in obs.; 云南植物志 2: 405. 1979. — *Rhus delavayi* Franch. in Bull. Soc. Bot. Franc. 33: 466. 1886, et Pl. Delav. 148. 1889, et in Not. Roy. Bot. Gard. Edinb. 7: 262. 1912; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 183. 1914; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 636. 1933; 陈嵘, 中国树木分类学 645. 1937; 中国高等植物图鉴 2: 636, 图 3001. 1972.

14a. 小漆树(原变种)

var. *delavayi*

小灌木, 高 0.5—2 米; 树皮灰褐色, 具椭圆形突起小皮孔, 幼枝紫色, 常被白粉, 无毛。