

**ssp. radicans**

原亚种产美国,我国不产。

15b. 刺果毒漆藤(亚种) 野葛\*(抱扑子、唐本草) 图版 35, 2—5

**ssp. hispidum** (Engl.) Gillis in *Rhodora* 73 (794): 213. 1971; 云南植物志 2: 407, 图版 122, 2—5. 1979.——*Rhus toxicodendron* var. *hispidum* Engl. in Bot. Jahrb. 29: 433. 1900.——*R. intermedia* Hayata in Journ. Coll. Sci. Tokyo 23: 73. 1908, et Ic. Fl. Form. 1: 162. 1911; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 365. 1936.——*R. orientalis* auct. non Schneid., Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 179. 1914; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 448. 1963, et in Fl. Taiw. 3: 569. 1977.

攀援状灌木;小枝棕褐色,具条纹,幼枝被锈色柔毛。掌状3小叶,叶柄长5—10厘米,被黄色柔毛,上面平或略具槽;侧生小叶长圆形或卵状椭圆形,长6—13厘米,宽3—7.5厘米,基部偏斜,圆形,全缘,叶面无毛,叶背沿中脉和侧脉疏被柔毛或近无毛,脉腋具赤褐色髯毛,顶生小叶倒卵状椭圆形或倒卵状长圆形,最宽处在叶的中上部,长8—16厘米,宽4—8.5厘米,先端急尖或短渐尖,基部渐狭;侧生小叶无柄或近无柄,顶生小叶柄长0.5—2厘米,被柔毛。圆锥花序短,长约5厘米,被黄褐色微硬毛;苞片长圆形,长约2毫米,被毛;花黄绿色,花梗长约2毫米,粗壮,被毛;花萼无毛,裂片卵形,长约1毫米或稍长,基部具3条褐色纵脉;花瓣长圆形,无毛,长约3毫米,开花时外卷,具不明显褐色羽状脉;雄蕊与花瓣等长,花丝线形,长约2毫米,花药长圆形,长约1毫米;花盘无毛;子房球形,径约0.5毫米。核果略偏斜,斜卵形,长约5毫米,宽约6毫米,外果皮黄色,被刺毛,刺毛长达1毫米,中果皮蜡质,果核黄色坚硬。

产四川、云南、贵州、湖南、湖北和台湾;生于海拔(630—)1600—2200米的林下。选模式采自四川南川。

本亚种与产美国的原亚种的区别在于:顶生小叶最宽处在叶的中上部,长为宽的2倍,基部楔形,小叶背面具赤褐色髯毛;果压扁,斜卵形,宽约6毫米,被刺毛,刺毛长达1毫米。

本种乳液极毒,易引起漆疮。

### 13. 三叶漆属——*Terminthia* Bernh.

Bernh. in *Linnaea* 22: 134. 1938.——*Searsia* F. A. Barkl. in Amer. Midl. Nat. 28: 472. 1942, in clavi sine descr. lat.——*Rhus* L., Sp. Pl. 265. 1753, p. p.; Engl. in DC. Monog. Phan. 4;

\*“野葛”这一名称极易与豆科葛藤属的种类相混,故中名另行新拟。

404. 1883, sect. *Gerontogae*, et in Engl. u. Prantl, Nat.

Pflanzenfam. 3 (5): 170. 1896, sect. *Gerontogae*.

灌木或小乔木。叶通常为掌状3小叶，稀为5小叶，小叶具齿或全缘。圆锥花序顶生和生于上部叶腋；花小，杂性；苞片宿存；花萼4—5裂，开展，宿存；花瓣4—5，开花时外卷；雄蕊4—5，花药卵形，纵裂；花盘浅盘状；子房卵圆形，极压扁，1室，1胚珠，室顶悬垂，花柱3，分离，着生于子房近顶端，柱头头状，微凹。核果近球形，压扁，多无毛，外果皮薄，膜质，与中果皮分离，中果皮厚，红色胶质，与内果皮连合，果核坚硬，压扁，具1种子。

约70种，产非洲南部至东部，少数种类分布到地中海地区，1种自印度东北部到我国西南部。

本属从 *Rhus* L. 中分出，其不同点是叶通常为掌状3小叶，花柱3，分离，近顶生；外果皮与中果皮分离，中果皮为红色胶质，与内果皮连合。

#### 1. 三叶漆(云南植物志) 图版36: 1—7

*Terminthia paniculata* (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 2: 408, 图版123, 1—7. 1979.——*Rhus paniculata* Wall. Cat. 993. 1828, nom. nud.; G. Don. Syst. 2: 73. 1832, descr.; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 10. 1876; Kurz For. Fl. Brit. Burm. 1: 319. 1877; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 421. 1883; Rehd. et Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 184. 1919.

灌木或小乔木，高2—6米；小枝圆柱形，无毛，疏生小皮孔。掌状3小叶，叶柄长2.5—4厘米，无毛，上面具槽；小叶坚纸质至薄纸质，椭圆形或长圆形或倒披针形，通常最宽处在叶的中上部，侧生小叶长3—7厘米，宽1.5—3厘米，顶生小叶长6—11厘米，宽2—4厘米，先端钝，具小尖头，基部阔楔形，全缘或略成浅波状，侧脉两面突起，网脉在叶面突起；小叶通常无柄。圆锥花序顶生或生于上部叶腋，宽大，被黄色微柔毛，长12—20厘米，多分枝，总梗及分枝纤细，下倾；苞片小，钻形，长1—2毫米，被微柔毛，小苞片极小；花淡黄色，花梗短，长约1毫米，被微柔毛；花萼无毛，裂片卵圆形，长约0.5毫米，先端钝，无毛；花瓣椭圆形，长约1.5毫米，宽约0.8毫米，无毛，两端钝，具褐色羽状脉；花丝细线形，长约0.5毫米，花药卵圆形，长约0.3毫米；花盘10裂，无毛；子房球形，径0.5—0.8毫米，无毛，花柱3，分离，近顶生，不等长，约0.5毫米，细线形，柱头头状。核果近球形，略压扁，径约4毫米，外果皮橙红色，无毛，具光泽，与中果皮分离，中果皮暗红色胶质。

产云南(南部至西南部)；生于海拔400—1500米的稀树草地或灌丛中。分布于不丹、印度东北部和缅甸北部。

#### 4. 肉托果族——Trib. *Semecarpeae* Engl.

Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 178. 1883, et in Engl. u.