

纹,侧脉约 15 对,斜升,近平行,在叶背突起,先端叉开,边缘处网结,细脉与侧脉成 90° ,网脉细,两面略显;叶柄长 1—1.5 厘米,被锈色微绒毛。圆锥花序顶生,长约 15 厘米,密被锈色微绒毛;苞片披针形,长约 1.5 毫米,密被锈色微绒毛;雄花无梗,黄绿色;花萼密被灰色微柔毛,裂片钝三角形,长约 0.5 毫米,边缘具细睫毛;花瓣 5,卵形,长 1.5—2 毫米,外面疏被灰白色极细微柔毛,具褐色羽状脉纹;花盘褐色,无毛;雄蕊与花瓣等长,花丝线形,长约 1 毫米,花药卵形,长约 0.7 毫米;退化子房被黄色绒毛;雌花未见。

产云南西南部;生于海拔 1200 米的山坡林中。分布于缅甸北部。

2. 网脉肉托果 图版 36: 8—12

Semecarpus reticulata Lecte. in Bull. Soc. Bot. Franc. 54: 610. 1907, et Fl. Gén. Indo-Chine 2: 40. 1908; Craib, Fl. Siam. Enum. 1 (2): 354. 1926; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 174, pl. 15, 7—9. 1962; 云南植物志 2: 410, 图版 123, 8—12. 1979.


乔木或大乔木,高 10—30 米;树皮灰白色,韧皮部具褐色树脂道,小枝粗壮,灰白色,无毛,具条纹和小皮孔,叶痕圆形,略突起。单叶互生,近革质,倒披针形,长 15—30 厘米,宽 4—7.5 厘米,先端急尖或短渐尖,基部近圆形,不下延,全缘,呈皱波状,两面无毛,叶面具光泽,叶背灰白色,中脉在叶面微凹,在叶背突起,具极细条纹,侧脉约 15 对,先端不叉开,近边缘处弧形网结,在叶背明显突起,细脉与侧脉成 90° 角,网脉两面明显突起;叶柄长 1.5—5 厘米,无毛,略压扁,上面具槽,基部增粗,具木栓质环裂。圆锥花序顶生或生于上部叶腋,比叶短,长约 15 厘米,被极细微绒毛;苞片狭三角形或钻形,外面被微绒毛,长 1—2 毫米;花梗长 0.5—1 毫米,被灰白色极细微绒毛;花萼外面被极细微绒毛,裂片三角形,长约 0.5 毫米,外面被毛,边缘具细睫毛;花瓣长圆形或卵状长圆形,长 1.5—2 毫米,宽约 1 毫米,外面疏被腺毛和极细微绒毛,具纵向树脂道条纹;花丝线形,长约 2 毫米,花药长约 0.7 毫米;花盘扁平,无毛;子房被毛。核果卵圆形,压扁,径约 1 厘米,被微柔毛,先端具宿存花柱,果时花托膨大,肉质,包于果的中下部。

产云南南部;生于海拔 540—1350 米的林中。分布于越南、老挝和泰国北部。

3. 大叶肉托果

Semecarpus gigantifolia Vidal, Syn. Atlas 22, t. 36, f. A. 1883; H. L. Li, Wood. Fl. Taiw. 451, f. 175. 1963, et in Fl. Taiw. 3: 573, pl. 733. 1977.——*S. vernicifera* Hayata et Kawakai in Hayata, Ic. Pl. Form. 2: 108. 1932; Kanehira, Form. Trees rev. ed. 367, f. 322. 1936.

常绿乔木;小枝灰色,无毛,具长圆形棕色皮孔。叶互生,常集生于小枝顶端,革质,椭圆状披针形或卵状披针形,长 25—50 厘米,宽 5.5—12 厘米,先端急尖或短渐尖或短尾尖,基部钝,两面无毛;叶面略具光泽,叶背苍白色,中脉在叶面平或略突,在叶背突起,侧脉约 20 对,与中脉成 70° 角,网脉两面突起;叶柄长 1—3 厘米。圆锥花序顶生,长约 17



1—7.三叶漆 *Terminthia paniculata* (Wall. ex G. Don) C. Y. Wu et T. L. Ming: 1.花枝; 2.雄花; 3.雌花; 4.雌花(去花萼和花瓣); 5.花瓣里面; 6.幼果; 7.花序轴毛被。8—12.网脉肉托果 *Semsicarpus reticulata* Lecte.: 8.花枝; 9.花; 10.花瓣; 11.果; 12.叶部分放大。(李锡畴绘)