

厘米;花白色,花梗短,长约2毫米;苞片三角形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花萼钟状,长约2.5毫米,萼齿明显或不明显;花瓣卵状披针形,长约5.5毫米,宽约2.5毫米,先端钝,基部截形;雄蕊与花瓣互生,比花瓣短,花丝线形,长约3毫米,花药长圆形;子房阔卵形,长约2毫米,胚珠悬垂于中上部。核果扁球形,先端偏斜,急尖,长约2.3厘米,宽约2厘米,果肉多树脂,内果皮骨质。

产我国台湾。分布于菲律宾。

15. 辛果漆属——*Drimycarpus* Hook f.

Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 424. 1862;

Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 471. 1883, et in Engl. u. Prantl,

Nat. Pflanzenfam. 3(5): 176. 1896.

大乔木。单叶互生,革质,全缘,具柄。花序总状,顶生或腋生;花小,杂性;花萼5裂,裂片钝三角形,覆瓦状排列;花瓣5,卵形,覆瓦状排列;雄蕊5,着生于花盘基部,花丝钻形,花药短心形,丁字着生,药室内向纵裂;花盘环状;子房下位,埋入下凹的花托中,子房壁与花托连合,1室,1胚珠,胚珠室顶悬垂,花柱1,顶生,较短,柱头头状。果时花托膨大,肉质,包于果的大部或近全部,果扁球形,无毛,具多数纵棱,果肉具纤维质,多树脂,果核大;种子与果同形,种皮膜质,胚厚,子叶略凸起。

2种,分布于锡金、不丹、印度东北部、缅甸、越南北部至我国(云南)。我国2种均产。

分种检索表

1. 叶椭圆形或长圆状披针形,先端渐尖,边缘皱波状;果较小,径约2厘米…………… 1. 辛果漆 *D. racemosus* (Roxb.) Hook. f.
 1. 叶倒卵形,先端平截或微凹;果较大,径约2.5厘米…………… 2. 大果辛果漆 *D. anacardiifolius* C. Y. Wu et T. L. Ming

1. 辛果漆(云南植物志) 图版 37: 3—6

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 424. 1862; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 36. 1876; Kurz, For. Fl. Brit. Burm. 1: 314. 1877; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 472. 1883; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 41. 1908; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 179. 1962; 云南植物志 2: 413, 图版 124, 3—6. 1979.——*Holigarna racemosa* Roxb. Fl. Ind. 2: 82. 1832.

大乔木,高8—18米;小枝圆柱形,灰褐色,无毛,具条纹和细小皮孔。叶革质,椭圆形或长圆形或长圆状披针形,长20—34厘米,宽5—10厘米,先端渐尖,基部楔形至圆形,

全缘，呈皱波状，两面无毛，叶面具光泽，叶背苍白色，侧脉 15—20 对，斜升，与边缘脉相连接，在叶面凹陷，叶背突起，网脉两面突起；叶柄长 1—2 厘米，粗壮，上面具槽。圆锥花序或总状花序长 2—10 厘米，疏被微柔毛或近无毛；花小，杂性；苞片三角状卵形，长约 0.5 毫米；花梗长约 1.5 毫米；花萼无毛，裂片钝三角形，长、宽约 0.7 毫米；花瓣卵形或阔卵形，直立，长 2.5—3 毫米，宽约 1.7 毫米，无毛；雄蕊着生在花盘基部，花丝钻形，长约 0.5 毫米，花药短心形，丁字着生，药室内向纵裂；雄花无不育雌蕊，两性花中子房下位，椭圆状，径约 2.5 毫米，无毛，花柱长约 1 毫米。果椭圆状，径约 2 厘米，果肉具纤维质，多树脂，果核革质；种皮膜质。

产云南东南部；生于海拔 130—900 米的山谷或沟边密林中。分布于不丹、锡金、印度东北部、缅甸及越南北部。

2. 大果辛果漆 (云南植物志) 图版 37: 7

Drimycarpus anacardiifolius C. Y. Wu et T. L. Ming, 云南植物志 2: 413, 图版 124, 7. 1979.

乔木，高达 15 米；小枝四棱形，黄褐色，无毛，具黄色小皮孔。叶厚革质，倒卵形，长 9—11.5 厘米，宽 5.8—6.4 厘米，先端平截或微凹，基部渐狭，全缘，略反卷，两面无毛，叶面绿色，具光泽，中脉粗，在叶面平，叶背极突起，具细条纹，侧脉 8—9 对，水平伸展达边缘，在叶面略显，叶背突起；叶柄粗壮，扁平，长约 2.5 厘米，无毛，基部暗褐色。花未见。果序总状，腋生或顶生，比叶短，长 4—6 厘米（连果），序轴和果梗无毛，具细小突起皮孔，果梗长约 1.5 厘米；果近球形，径约 2.5 厘米，黄绿色，无毛，具多数纵棱。

产云南西南部；生于海拔 680—700 米的沟谷密林中。模式标本采自云南沧源。

近于辛果漆 *D. racemosus* (Roxb.) Hook. f., 但叶为倒卵形，先端平截或微凹，果大，径约 2.5 厘米。

5. 九子母族——Trib. Dobineace Engl.

Engl. in Engl. u. Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 177. 1896.

灌木或亚灌木状草本。单叶互生或对生。花雌雄异株，雌花无花被，单心皮的子房贴生在大的叶状苞片中部，花梗与苞片中脉合生，果为增大的苞片所托。

本族我国有 1 属。


16. 九子母属——*Dobinea* Buch.-Ham. ex D. Don

D. Don, Prodr. Fl. Nep. 249. 1825; Engl. in Engl. u

Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 177. 1896.——*Podoon* Baill.

in Bull. Soc. Linn. Paris 1: 681. 1887.

灌木或多年生具肥大根状茎的亚灌木状草本。单叶互生或对生，具长柄，不分裂，羽



1—2. 小果肉托果 *Semecarpus microcarpa* Wall.: 1. 花枝; 2. 雄花。3—6. 辛果漆 *Drimycarpus racemosus* (Roxb.) Hook. f.: 3. 果序; 4. 叶; 5. 花; 6. 雄蕊。7. 大果辛果漆 *Drimycarpus anacardifolius* C. Y. Wu et T. L. Ming: 7. 果枝。(李锡畴绘)