

厘米;花白色,花梗短,长约2毫米;苞片三角形,长约1毫米,边缘具细睫毛;花萼钟状,长约2.5毫米,萼齿明显或不明显;花瓣卵状披针形,长约5.5毫米,宽约2.5毫米,先端钝,基部截形;雄蕊与花瓣互生,比花瓣短,花丝线形,长约3毫米,花药长圆形;子房阔卵形,长约2毫米,胚珠悬垂于中上部。核果扁球形,先端偏斜,急尖,长约2.3厘米,宽约2厘米,果肉多树脂,内果皮骨质。

产我国台湾。分布于菲律宾。

15. 辛果漆属——*Drimycarpus* Hook f.

Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 424. 1862;

Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 471. 1883, et in Engl. u. Prantl,

Nat. Pflanzenfam. 3(5): 176. 1896.

大乔木。单叶互生,革质,全缘,具柄。花序总状,顶生或腋生;花小,杂性;花萼5裂,裂片钝三角形,覆瓦状排列;花瓣5,卵形,覆瓦状排列;雄蕊5,着生于花盘基部,花丝钻形,花药短心形,丁字着生,药室内向纵裂;花盘环状;子房下位,埋入下凹的花托中,子房壁与花托连合,1室,1胚珠,胚珠室顶悬垂,花柱1,顶生,较短,柱头头状。果时花托膨大,肉质,包于果的大部或近全部,果扁球形,无毛,具多数纵棱,果肉具纤维质,多树脂,果核大;种子与果同形,种皮膜质,胚厚,子叶略凸起。

2种,分布于锡金、不丹、印度东北部、缅甸、越南北部至我国(云南)。我国2种均产。

分种检索表

1. 叶椭圆形或长圆状披针形,先端渐尖,边缘皱波状;果较小,径约2厘米…………… 1. 辛果漆 *D. racemosus* (Roxb.) Hook. f.
 1. 叶倒卵形,先端平截或微凹;果较大,径约2.5厘米…………… 2. 大果辛果漆 *D. anacardiifolius* C. Y. Wu et T. L. Ming

1. 辛果漆(云南植物志) 图版 37: 3—6

Drimycarpus racemosus (Roxb.) Hook. f. in Benth. et Hook. f. Gen. Pl. 1: 424. 1862; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 2: 36. 1876; Kurz, For. Fl. Brit. Burm. 1: 314. 1877; Engl. in DC. Monog. Phan. 4: 472. 1883; Lecte. Fl. Gén. Indo-Chine 2: 41. 1908; Tard.-Blot in Aubr. Fl. Camb. Laos et Vietn. 2: 179. 1962; 云南植物志 2: 413, 图版 124, 3—6. 1979.——*Holigarna racemosa* Roxb. Fl. Ind. 2: 82. 1832.

大乔木,高8—18米;小枝圆柱形,灰褐色,无毛,具条纹和细小皮孔。叶革质,椭圆形或长圆形或长圆状披针形,长20—34厘米,宽5—10厘米,先端渐尖,基部楔形至圆形,