

6 厘米, 宽 1.2—2.5 厘米, 侧脉 6—7 对; 果较小, 直径 3—5 毫米, 而不同。

产于四川西部 (峨眉、峨边、天全、洪雅、冕宁); 生于山坡林中。模式标本采自四川峨眉山。

102. 狭叶冬青 (中国树木分类学)

Ilex fargesii Franch. in Journ. de Bot. **12**: 255. 1898; Loes. ex Diels in Bot. Jahrb. Engl. **29**: 435. 1900; Loes. in Nov. Act. Acad. Leop. -Carol. Nat. Cur. **78**: 239 (Monog. Aquif. 1: 239). 1901, et in Sarg. Pl. Wils. **1**: 77. 1911; S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **31**: 44. 1950; 中国高等植物图鉴 **2**: 652, 图 3034. 1972; 秦岭植物志 **1** (3): 196, 图 172: 1981; 中国高等植物图鉴补编 **2**: 213. 1983, in clavi; 四川植物志 **4**: 224, 图版 61: 6. 1988. — *Ilex fargesii* Franch. var. *megalophylla* Loes. in Sarg. Pl. Wills. **1**: 77. 1911.

102a. 狭叶冬青 (原变种) 法氏冬青 (峨眉植物图志), 城口冬青 (秦岭植物志) 图版 25: 5—8

var. *fargesii*

常绿乔木, 高 4—8 米, 全株无毛; 小枝褐色或栗褐色, 圆柱形, 无毛, 具横皱纹, 三角形凸起的叶痕和皮孔, 幼时绿色, 具纵棱脊; 顶芽狭圆锥形, 急尖。叶生于 1—3 年生枝上, 叶片近革质, 倒披针形或线状倒披针形, 长 5—13 (—16) 厘米, 宽 1.5—2.5 (—3.7) 厘米, 先端渐尖, 基部楔形或钝, 边缘中部以上具疏细锯齿, 中下部全缘, 叶面绿色, 背面浅绿色, 主脉在叶面狭凹陷, 背面隆起, 侧脉每边 8—10 条, 在叶面明显, 背面突起, 网状脉在叶面不明显, 背面明显; 叶柄长 8—16 毫米, 上面具槽, 顶部具叶片下延的狭翅, 无毛。花序簇生于二年生枝叶腋内, 花白色, 芳香。雄花: 每束的单个分枝为具 3 花的聚伞花序, 总花梗长约 1 毫米, 无毛, 苞片膜质, 三角形, 具缘毛, 花梗长约 2 毫米, 无毛, 近基部具 2 枚三角形或阔三角形、具缘毛的小苞片; 花萼盘状, 直径约 2 毫米, 4 浅裂, 裂片近圆形, 长约 1 毫米, 具疏缘毛; 花冠直径约 5 毫米, 花瓣 4, 倒卵状长圆形, 长约 2—2.5 毫米, 宽约 1.5 毫米, 具缘毛, 基部稍合生; 雄蕊长为花瓣的 3/4, 花药长圆形; 退化子房卵状圆锥形, 先端钝, 微 4 裂。雌花: 单个分枝具 1 花, 花梗长 2—3 毫米, 中下部具 2 枚小苞片; 花萼与雄花相同; 花瓣长圆形, 长约 2 毫米, 分离; 退化雄蕊长不及花瓣, 败育花药箭头形; 子房卵球形, 直径 1.2—2 毫米, 柱头盘状。果序簇生, 单个分枝具 1 果, 果柄长 5—7 毫米, 无毛, 中下部具宿存小苞片; 果球形, 直径 5—7 毫米, 成熟时红色, 具纵条纹, 宿存柱头薄盘状, 4 浅裂, 宿存花萼平展; 分核 4, 长圆形, 长 4—4.5 毫米, 背宽 3—3.5 毫米, 背面凸起, 具掌状条纹和沟, 两侧面具纵条纹及沟或有时具网状沟纹, 内果皮木质。花期 5 月, 果期 9—10 月。

产于陕西南部 (大巴山、平利、镇坪)、甘肃南部 (武都、文县)、湖北西部 (鹤峰、宣恩、巴东、兴山、神农架、竹溪) 和四川。生于海拔 1600—3000 米的山地林中