

毫米, 4 浅裂, 浅裂片三角形, 具缘毛, 宿存柱头盘状; 分核 4, 长圆体形, 长 3.5 毫米, 背部宽 2 毫米, 具掌状条纹和浅沟, 侧面具条纹及沟, 内果皮石质。

产于云南贡山 (独龙江与恩梅开江支流分水岭 Taron-Tarn divide, 模式标本产地, T. T. Yu (俞德浚 20137, fr. PE)。

本种与弯尾冬青 *I. cyrtura* Merr. 极近, 惟后者的幼枝无毛或在沟槽内疏被微柔毛, 叶柄及花梗被微柔毛, 果球形, 无毛, 直径 6 毫米, 内果皮木质; 而本种的幼枝、叶柄及果梗均密被短柔毛, 果近球形或椭圆状球形, 长 5 毫米, 直径 4 毫米, 被短柔毛, 内果皮石质而不同, 故恢复其种的地位。

104. 毛枝冬青 (植物研究) 图版 28: 1—2

Ilex dasyclada C. Y. Wu ex Y. R. Li in Bull. Bot. Res. 5 (1): 13, pl. 4: 2. 1985; 云南植物志 4: 253, 图版 71: 1—2. 1986.


常绿灌木, 高 1.6—2.5 米; 小枝较细, 圆柱形, 具纵棱及槽, 干时浅黄褐色, 密被短的微柔毛, 具微凸起的叶痕, 无皮孔; 顶芽狭圆锥形, 顶端短渐尖, 密被短的微柔毛。叶生于 1—2 年生枝上, 叶片纸质, 长圆形或长圆状椭圆形, 稀卵形, 长 5—9 厘米, 宽 2—3.5 厘米, 先端渐尖, 基部钝至近圆形, 边缘稍反卷, 具疏离且不明显的细圆齿, 齿尖黑色, 叶面绿色, 背面淡绿色, 干时浅橄榄绿色, 两面无毛, 主脉在叶面凹陷, 背面隆起, 侧脉 6—8 对, 弧曲上升, 于近叶缘处网结, 在叶面平坦而明显, 在背面微凸起, 网状脉两面可见; 叶柄长 5—8 毫米, 上面具槽, 槽内被微柔毛, 背面具横皱纹。花及花序未见。果序假总状, 生于当年生枝叶腋内, 果序轴长 2—5 毫米, 连同长约 2 毫米的果梗均密被极短的微柔毛, 果梗基部具 2 枚卵状小苞片, 密被短柔毛; 果球形 (未成熟幼果), 直径 3—4 毫米, 密被极短的微柔毛, 宿存花萼平展, 直径约 2 毫米, 4 浅裂, 裂片卵状三角形, 被微柔毛, 具缘毛; 宿存柱头厚盘状, 微 4 裂; 分核 4, 未成熟。果期 (幼果) 4 月。

产于云南景东 (模式标本产地, 李鸣岗 M. K. Li 3350, fr. KUN); 生于海拔 1600 米的山坡混交林中。

本种的小枝毛被、叶形等方面与平南冬青 *I. pingnanensis* S. Y. Hu 相似, 但后者的叶片革质, 较大, 果序簇生于二年生枝的叶腋内, 无毛。本种的叶片纸质, 较小, 果序假总状, 生于当年生枝的叶腋内, 幼果被极短的微柔毛而不同。

105. 假枝冬青 (云南种子植物名录)

Ilex wangiana S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. 31 (1): 54. 1950; 云南种子植物名录, 上册; 749. 1984. — *I. corallina* Franch. var. *wangiana* (S. Y. Hu) Y. R. Li in Bull. Bot. Rec. 5 (1): 16, pl. 5, 2. 1985; 云南植物志 4: 255. 1986; 横断山区维管植物上; 1091. 1993. — *Ilex corallina* auct. non Franch.; Anon. in Not. Bot. Gard. Edinb. 17: 137. 1929.



图版 28 1—2. 毛枝冬青 *Ilex dasyclada* C. Y. Wu ex Y. R. Li: 1. 果枝, 2. 果; 3—4. 茎花冬青
I. cauliflora H. W. Li ex Y. R. Li: 3. 果枝, 4. 果。(吴锡麟绘)