

状, 6 裂, 裂片阔三角形, 急尖或钝, 具缘毛; 宿存柱头乳头状, 极凸起; 分核 6, 椭圆形, 长 3—4 毫米, 宽 1.5—2 毫米, 背部具 3 条纵纹和 2 沟, 侧面具细条纹, 内果皮革质。 果期 10 月。

产于云南东南部(砚山、广南)、中部(富民)和西部(漾濞); 生于海拔 1200—2200 米的山坡林中。模式标本采自云南砚山(王启无 84381, fr. KUN)。

Ilex mamillata C. Y. Wu ex Y. R. Li (1985) 是与曾沧江(1984)代吴征镒教授发表的模式产于广西桂林的 *Ilex mamillata* C. Y. Wu ex C. J. Tseng 重名, 但两者不是一个东西, 为异物同名, 故起新名, 为纪念吴征镒教授对植物学的贡献及对冬青科的工作, T. R. Dudley 特以吴姓命名。

151. 小金冬青 (热带亚热带植物学报)

Ilex xiaojinensis Y. Q. Wang et P. Y. Chen in Journ. Trop. Subtrop. Bot. 3 (1): 31, fig. 2. 1995.

常绿灌木, 高 1—2 米, 全株无毛; 小枝圆柱形, 灰白色, 具纵棱。叶生于 1—2 年生枝上, 叶片革质, 狭披针形, 长 6—9 厘米, 宽约 8 毫米, 先端渐尖, 基部楔形, 边缘具微钝齿, 叶面绿色, 具光泽, 干后褐色, 背面淡绿色, 密具腺点, 主脉在叶面凹陷, 背面隆起, 侧脉不明显; 叶柄长约 5 毫米, 上面具纵槽, 背面圆形。花序簇生于叶腋内, 3—5 花排成假伞形花序, 花序梗极短或几乎无, 花梗长约 2 毫米, 花杂性(?), 4 基数, 黄绿色, 花萼杯状, 4 裂, 裂片卵状三角形, 长约 0.5 毫米; 花瓣离生, 卵状长圆形, 长约 3 毫米; 雄蕊 4, 与花瓣互生, 长丝长约 2 毫米, 花药长圆形, 长约 1 毫米; 退化子房球形, 顶端略平。雌花未见。果通常单生或 2 个聚生叶腋, 果梗长约 4 毫米; 果近球形, 直径约 5 毫米, 鲜时绿色, 具 8 条纵棱沟。 花期 3—5 月, 果期 6—10 月。

产于广东博罗小金(模式标本产地, 王英强 670, IBSC); 生于海拔 400—550 米的沟旁密林中。

本种与柳叶冬青 *Ilex salicina* Hand.-Mazz. 相似, 惟本种植物矮小, 叶缘具钝齿, 花序梗极短或几无, 果柄短, 果具 8 条纵棱而易区别。

152. 庆元冬青 (杭州大学学报)

Ilex qingyuanensis C. Z. Zheng, 杭州大学学报 2: 73, 图 1—5. 1980; 浙江植物志 4: 18, 图 4—27. 1993.

常绿乔木, 高 18 米; 树皮灰褐色, 当年生小枝栗色。叶片厚革质, 阔卵形或卵状椭圆形, 长 5—10 厘米, 宽 2.5—5 厘米, 先端渐尖, 尖头钝, 微凹, 基部阔楔形, 全缘, 叶面具光泽, 背面具散生腺点, 主脉在叶面上方 1/2 凸起, 下方的 1/2 凹陷, 在背面隆起, 侧脉 10—13 对, 在叶面隐约可见, 背面明显; 叶柄长约 10 毫米, 上面具槽。花未见。果 4—6 个簇生叶腋, 果梗长 4—5 毫米, 被短柔毛; 果球形, 直径约 5 毫米,