

15. 果较小, 直径约 5 毫米, 成熟时红色, 果梗长 6—7 毫米; 分核 5; 雄花的花萼直径 2.5 毫米, 5 浅裂, 裂片边缘啮蚀状; 退化子房垫状, 中央略凹陷

..... 203. 大柄冬青 *I. macropoda* Miq.

15. 果较大, 直径 6—8 毫米, 成熟时紫黑色, 果柄长 2—3 毫米; 分核 6; 雄花的花萼较大, 直径 4 毫米, 6 裂, 裂片全缘; 退化子房垫状, 中央平坦不凹陷

..... 204. 紫果冬青 *I. tsuii* Merr. et Chun

组 1. 假落叶冬青组 Sect. 1. *Pseudoprinos* S. Y. Hu in Journ. Arn. Arb. **30** (1): 259. 1949.

落叶灌木或小乔木; 具长枝和缩短枝, 皮孔明显; 叶片具锯齿; 花序少数簇生或单生; 花 6—16 基数; 子房具花柱, 柱头头状或鸡冠状; 果强烈地顶极扁球形; 分核 6—3, 平滑, 具条纹, 内果皮近木质。

国产 1 种。

193. 薄叶冬青 (云南种子植物名录)

Ilex fragilis Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 602. 1875; Loes. in Nov. Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. **78**: 492 (Monog. Aquif. **1**: 492) 1901; S. Y. Hu. in Journ. Arn. Arb. **30** (3): 259. 1949; Banerji in Journ. Bombay Nat. Hist. S. **55**: 253. 1958, et in Candollea **19**: 218. 1964, et in Rec. B. Surv. Ind. **19** (2): 32. 1966. Hara in Fl. East. Him. **187**. 1966, cum f. *kingii* Loes, et in Hara et Williams, Enum. Flow. Pl. Nal. **2**: 87. 1979; Murata in Acta Phyt. Geobot. **25**: 113. 1973; 云南种子植物名录, 上册 742. 1984; 云南植物志 **4**: 208. 1986; 西藏植物志 **3**: 110. 1986; 四川植物志 **2**: 185, 图版 53: 1. 1988; 横断山区维管植物 **1**: 1084. 1993. ——*Ilex fragilis* Hook. f. *subcoriacea* C. J. Tseng in Bull. Bot. Res. **1** (1—2): 39. 1981; 四川植物志 **4**: 186. 1988, Syn. nov.

193a. 薄叶冬青 (原变型) 扁果冬青 (四川植物志), 绿皮子 (云南禄劝) 图版 50: 1—4

f. *fragilis*

落叶灌木或小乔木, 高 3—5 米; 小枝具长枝和短枝之分, 栗褐色, 无毛, 长枝具显著的椭圆形或圆形白色皮孔, 短枝具极多叶痕皱及宿存芽鳞; 顶芽卵形, 芽鳞卵形, 具缘毛。叶在长枝上互生, 在短枝上丛生于枝顶端, 叶片膜质或纸质, 卵形至椭圆形, 长 4—8 厘米, 宽 3—5 厘米, 先端渐尖, 基部圆形至钝, 边缘具锯齿, 叶面深绿色, 背面淡绿色, 两面无毛, 主脉在叶面凹陷, 在背面隆起, 侧脉 8—10 对, 网状脉在背面明显; 叶柄长 5—15 毫米, 淡紫红色, 无毛; 托叶小, 三角形。雌雄异株; 雄花: 组成聚伞花序, 几个或单个或单花腋生, 基部具鳞片; 花梗长 3—6 毫米, 无毛; 花 6—8 基