

窄卵形或卵形，少为卵状阔披针形，长4—10厘米，宽2—4.5厘米，先端急尖或钝，偶为短渐尖，基部圆形，偶为阔楔形或近截形，边缘有明显锯齿或重锯齿，侧脉4—7对，近基部的一对有时伸长至近叶中部处而使叶脉稍呈三出状，侧脉在近边缘处结网，三生脉细而曲折，与侧脉形成明显脉网；叶柄长8—14毫米。聚伞花序通常2—4次分枝；花序梗常细长，通常长2—4厘米，分枝稍短；小花梗长4—6毫米，中央花近无梗或具长1—2毫米的小花梗；苞片小苞片锥状线形或锥形，长1—3毫米，宿存；花紫棕色或外棕内白（据采集记录 Maire 213），直径4—8毫米；花萼裂片薄，有3脉；花瓣长方阔卵形或近圆形，花盘4浅裂，裂片中央有肥厚突起，雄蕊着生突起上，约在距子房与边缘中间处，无花丝；子房大部生于花盘内，无花柱，柱头盘状。蒴果黄色，近球状，直径1—1.2厘米；果序梗细长，长2.5—4厘米；小果梗长1—1.2厘米；种子紫褐色，假种皮包围背部。

产于广西、云南及四川西南角。生长于海拔2000—2900米的山地林中或溪边，沟内。分布于喜马拉雅、锡金。模式标本采自锡金。

本种叶的大小变化很大，一般长成植株上叶通常较大，而在幼株或匍匐地面植株上，叶长可小至3—4厘米，宽1—1.2厘米。

4. 游藤卫矛 石宝茶藤（西藏植物志）

Euonymus vagans Wall. ex Roxb. Fl. Ind. ed. 2: 412. 1824; Laws. in Hook. f. Fl. Brith. Ind. 1: 611. 1875; Blakel. in Kew Bull. 1951: 267. 1951; 全国中草药汇编（下）395. 1978; 西藏植物志 3: 127. 1981.

藤本，高1.5—3米。叶近革质或厚纸质，长方椭圆形，椭圆披针形偶或窄卵披针形，长5—12厘米，宽2.5—5厘米，偶有更大或更小，先端急尖或钝，偶为短渐尖，基部楔形或阔楔形，边缘有不明显疏浅锯齿，齿端有时内曲，侧脉6—7对，细韧；叶柄长6—12毫米。聚伞花序腋生，2—3次分枝；花序梗长1.2—2厘米，中央花小花梗细长，长8—10毫米，通常与第一次分枝近等长或超过，稀稍短，小聚伞3花疏生，小花梗近等长；花白色或黄白色，直径约5毫米；花萼4浅裂；花瓣近圆形或长圆形，基部微窄缩，雄蕊具花丝，长约1毫米，基部稍宽；花盘近方形；子房具短花柱，受精后伸长成明显柱状。蒴果近圆球状，直径7—8毫米，熟后有时可达1厘米；种子每室1—2个，深棕色，种脊色浅，长达种子2/3。

产于云南、西藏。生长在山地沟谷丛林中。分布尼泊尔、印度、锡金。模式标本采自印度。Flora British India 记载本种绝无随生根，但云南标本仍见到偶有随生根。因为本种花果全在当年幼枝上，所以标本上很难见到生长在较老枝上的随生根。

本种叶形及花序梗及分枝常多变异，在鉴定上较不易掌握情况，但本种有几项稳定特征，即叶有柄，通常在5毫米以上，花较小，直径约为5毫米，中央花有较长小花梗，蒴果平滑，较小，直径通常不足1厘米，与相似种类可以区别。