

1926; 中国高等植物图鉴 2: 667, 图 3063. 1972; 湖北植物志 2: 434, 图 1374. 1979; 秦岭植物志 1 (3): 205. 1981.

灌木或小乔木, 高达 6 米; 小枝黄绿色, 被细密瘤突。叶革质, 平滑光亮, 椭圆披针形或窄椭圆形, 长 5—11 厘米, 宽 3—5 厘米, 先端圆钝或急尖, 边缘全缘或近全缘, 侧脉明显, 常曲折 1—3 次, 小脉明显, 并结成纵向的不规则菱形脉岛, 叶背常呈灰绿色; 叶柄短, 长 3—5 毫米。聚伞花序多为 1—2 次分枝, 小花 3—5—7, 稀达 9 朵; 花序梗长 1.5—2.5 厘米, 中央小花梗长约 5 毫米, 两侧小花梗长约 2 毫米; 花淡黄色, 直径 6—8 毫米, 4 数; 雄蕊花丝长 1 毫米以上。蒴果球状, 有 4 浅沟, 直径达 15 毫米, 果皮极平滑, 黄白带粉红色; 种子每室 1 个, 稍肾状, 假种皮橘红色。花期 5—7 月, 果熟期 8、9 月。

产于陕西、湖北、四川、云南。生长于山间林下或岩石山坡林丛中。模式标本采自陕西。

13. 茶色卫矛 (植物研究)

Euonymus theacolus C. Y. Cheng, 植物研究 14 (4): 349. 图 1. 1994.

常绿灌木, 高 1 米; 当年生小枝四棱形, 小枝密被细小疣点。叶对生, 革质, 长方形或长方卵形, 长 5—10 厘米, 宽 2—4.5 厘米, 先端渐尖或钝, 基部阔楔形或近圆形, 边缘反卷, 全缘或具疏圆齿, 两面无毛, 侧脉 5—7 对, 叶面突出, 背面稍隆起, 网脉两面隆起; 叶柄粗壮, 长 3—5 毫米, 上面有纵槽。聚伞花序 2—3 次分枝, 腋生, 具 7—15 花; 总花梗粗壮, 四棱, 长 1—1.5 厘米, 小花梗长 2—3 毫米, 中央花具梗; 苞片三角状披针形; 花 4 数, 直径约 8 毫米, 黄色; 萼片半圆形, 全缘; 花瓣阔卵形或近圆形, 长 2—2.5 毫米; 边缘波状; 花盘厚, 4 裂; 雄蕊着生于花盘边缘, 花药心形, 长约 1 毫米, 花丝长约 1.5 毫米; 子房略凹陷球形, 4 室, 各室具 2 胚珠, 花柱圆柱状, 长约 1 毫米, 柱头平, 幼果具 4 棱。

产于贵州 (册亨)。生于海拔 1 200 米灌丛中。模式标本采自贵州。

14. 拟游藤卫矛 (新拟)

Euonymus vaganoides C. Y. Cheng ex J. S. Ma in Harvard Papers in Botany, No. 10. 93. 1997.

攀援, 灌木状; 枝圆柱形, 粗壮。叶簇生于枝端, 椭圆状倒卵形, 长 8—10 厘米, 宽 3—5 厘米, 厚革质, 先端骤尖, 基部渐狭, 边缘具稀圆齿, 侧脉 5—7 对, 于背面隆起; 叶柄粗壮, 长约 3 毫米。花未见。蒴果生于枝端, 腋生, 单独或成对, 近球形, 直径 6—9 毫米, 干时紫色, 密被小白斑点; 种子每室 2, 具橙红色假种皮。

产于湖南、广西、云南。生于海拔 1 250 米山坡林下。模式标本采自云南屏边。

15. 冬青卫矛 (中国高等植物图鉴) 正木, 大叶黄杨 图版 1: 1—3

Euonymus japonicus Thunb. in Nov. Act. Soc. Sci. Upsal. 3: 218. 1781; Linn.