

直径6—8毫米；萼片边缘有短纤毛；花瓣近圆形；花盘近圆形；雄蕊着生花盘边缘，花丝三角锥状，长多在1毫米以下；子房有短花柱。蒴果黄色或淡黄白色，干时黄色或灰白色，球状，直径带刺约2厘米，刺密而细长，长5—8毫米；种子长卵状，被橘黄色假种皮。

分布于四川（峨眉山、峨边、天全、乐山）、云南和广西西北部（天峨、乐业、隆林）。模式标本采自四川峨眉山。

26. 灰绿卫矛（新拟）

Euonymus cinereus Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 611. 1875; Blakel. in Kew Bull. **1951**: 273. 1951.

灌木，常藤本状，高约1米；小枝灰绿色。叶纸质或薄革质，干后灰绿色或浅绿色，椭圆形、阔椭圆形、窄椭圆形或阔倒卵形，长（4—）6—10厘米，宽1.5—5厘米，先端急尖或钝，有时近圆形，基部楔形或阔楔形，边缘有疏浅细锯齿，侧脉4—6对，细而不甚明显；叶柄细，长4—8毫米。聚伞花序3—4次分枝，花序梗、分枝及小花梗均纤细，花未见。蒴果灰白浅绿色，密被细短刺，近球状，直径连刺约1.5厘米，刺长1—2毫米，果序梗细长，长2—3厘米，小果长约5毫米。

产于贵州、云南（富宁）、广西（南丹、平南瑶山）；分布于喜马拉雅、印度（阿萨姆）和孟加拉。模式标本采自孟加拉。我国仅见到云南、贵州和广西的标本，与产于孟加拉的 Griffith 标本（模式 K!）特征符合，但叶较薄，多为椭圆形。而在模式标本上也有很多椭圆形的叶，虽然 Lawson 的原记载为叶阔倒卵形。

27. 星刺卫矛（新拟） 图版 3: 1—2

Euonymus actinocarpus Loes. in Engl. Bot. Jahrb. **30**: 459. 1962; in Engl. et Prantl. Pflanzenfam. **20B**: 120. 1942, Blakel. in Kew. Bull. **1951**: 274. 1951.

灌木，高达4米；小枝4棱明显，棱有时稍宽。叶革质，阔卵形、长方阔卵形或长方椭圆形，长6—11厘米，宽（2—）4—5厘米，先端渐尖或极短渐尖，基部阔楔形或近圆形，偶为楔形，边缘具密生浅锯齿，侧脉4—7对，有时下凹；叶柄短粗，长3—6毫米。花序多花，通常3—4次分枝；花序梗长1.5—3厘米，分枝稍短；小花梗长1—2毫米，3小花梗近等长，所有花梗均4棱明显，有时呈4窄翅状；苞片和小苞片细小，三角形，早落；花黄绿色，直径5—7毫米；萼片宽扁近肾形；花瓣倒卵形；花盘有4浅裂片；雄蕊着生花盘裂片小突起上，无花丝；子房具极短花柱。蒴果棕红色，近球状或扁球状，直径连刺1.5—1.8厘米，刺长而密集，长5—7毫米，基部稍宽。

产于湖北（宜昌），四川（峨眉山）。模式标本采自湖北宜昌。

28. 刺猬卫矛（新拟）

Euonymus hystrix W. W. Smith in Not Roy. Bot. Gard. Edinb. **13**: 160, 1921; Blakel. in Kew Bull. **1951**: 274. 1951.



图版 3 1—2. 墨刺卫矛 *Euonymus actinocarpus* Loes.: 1. 果枝, 2. 花放大。3. 软刺卫矛 *E. aculeatus* Hemsl.: 果枝。(林子拼抄自宗维城)