

直径6—8毫米；花瓣稍肉质，阔椭圆形；雄蕊着生花盘边缘上沿；花丝长过柱头，花药内向、背着，在与花丝相连处有肿胀的圆环；花盘薄，紧贴子房，大部与之合生，分界不显，无花柱，柱头头状。花期冬季。

产于海南。生长于平地瘠土林中。模式标本采自海南。

10. 白树沟瓣 (中国高等植物图鉴补编) 隐脉沟瓣花 (中山大学学报)

Glyptopetalum geloniifolium (Chun et How) C. Y. Cheng, comb. nov. — *Euonymus geloniifolius* Chun et How 植物分类学报 7 (1): 45. 图版 15, 2. 1958. — *G. geloniifolium* (Chun et How) C. Y. Cheng, 中国高等植物图鉴补编 2: 241. 图 8818. 1983, nom. inval. — *G. occultonervatum* Miau, 中山大学学报 (自然科学版) 32 (4): 60. 1993. syn. nov.

10a. 白树沟瓣 (原变种)

Glyptopetalum geloniifolium (Chun et How) C. Y. Cheng var. *geloniifolium*

常绿灌木，高1—2米。叶片革质，椭圆形或较窄，偶为倒卵窄椭圆形，长5—12厘米，宽2.5—6厘米，先端圆钝或常微凹，基部宽楔形向柄下延，边缘上下皱缩成浅波状；叶柄长约5毫米。聚伞花序1—2次分枝，花序梗长2—3厘米，分枝长1—1.5厘米，二次分枝更短，小花梗长近1—2毫米，中央花有明显小花梗；花4数，白绿色，直径约8毫米；萼片边缘常黑褐色，干膜质；花瓣边缘啮蚀状，花盘与子房分界不明显，雄蕊着生其边缘上，花丝长约1.5毫米；子房无明显花柱，柱头窄小。蒴果扁球状，直径约15毫米，红色，表面多少有糠秕状斑块；种子紫褐色，卵状，长约8毫米，假种皮淡黄色，顶端开口。花期7—8月，果成熟期12月至翌年2月。

产于广东、海南及广西。生长于海边、河边、山坡等处的疏林中。模式标本采自海南。

10b. 大叶白树沟瓣 (变种)

Glyptopetalum geloniifolium (Chun et How) C. Y. Cheng var. **robustum** (Chun et How) C. Y. Cheng, comb. nov.

— *Euonymus geloniifolium* var. *robusta* Chun et How 植物分类学报 7 (1): 47. 1958. — *G. geloniifolium* var. *robustum* (Chun et How) C. Y. Cheng, 中国高等植物图鉴补编 2: 241. 1983. nom. inval.

与原变种不同之处为 (1) 叶较大，长10—18厘米，宽6—8厘米，先端急尖或钝，(2) 中央花无小花梗。

产地分布与原变种同。模式标本采自海南。

3. 永瓣藤属 *Monimopetalum* Rehd.

Rehd. in Journ. Arn. Arb. 7: 233. 1926; 侯宽昭, 中国种子植物