

5—17 毫米，小花梗长 3—5 毫米；花小白色，直径约 4 毫米；萼片长圆形；花瓣窄卵形；花盘窄小；雄蕊着生其外侧下方；子房近锥状，柱头圆，微 2 裂。蒴果倒圆锥状，长约 7 毫米，熟时淡红色，常 2 裂，果序梗及小果梗均稍增长，极细弱；种子棕红色，基部有细小假种皮。

产于贵州（罗甸），极少。生长于山坡丛林中。模式标本采自贵州罗甸。

7. 淡红美登木（新拟） 红色梅丹（西藏植物志）

Maytenus rufus (Wall.) Cufod in Svensk Biol. **43**: 3131. 1962; Hara in Jour. Jap. Bot. **40**: 327. 1965; 西藏植物志 **3**: 135, 图 52-2. 1986. ——*Celastrus rufa* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed. Carey **2**: 397. 1824. ——*Gymnosporia rufa* (Wall.) Laws. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. **1**: 670. 1875.

乔木；小枝有疏刺，刺细长，长 1.2—2.5 厘米。叶近革质，叶面绿色，叶背灰绿色，披针形，长 6.5—11 厘米，宽 2—3.5 厘米，先端急尖，边缘有锯齿；叶柄长 5—8 毫米。聚伞花序丛生，二歧分枝，花序梗及小花梗均纤细，花序梗长 2—4.5 厘米，花小，直径 3—4 毫米。蒴果倒三角卵状，长 6—10 毫米；种子黑色。

产于西藏（樟木）。生长于海拔 600—1 800 米，干热土壤中。分布印度、不丹等喜马拉雅热带部分地区。模式标本采自印度。

本种在我国分布首次记载于西藏植物志（1986）中。但其描述中说未见花，而插图是花枝，描述中描写蒴果，而图上无果，因未见西藏标本，不能肯定是否确为本种。本文记述主要根据 Lawson（1875）所载。

8. 金阳美登木（四川大学学报）

Maytenus jinyangensis C. Y. Chang, 四川大学学报, **1985** (2): 88. 照片（无号）。1985. ——*M. sinomontanus* C. Y. Cheng 中国高等植物图鉴补编 **2**: 263. 1983, 在检索表中, nom. inval.

灌木，高达 1.5 米，多刺，刺长直，长 1—1.2 厘米，生于二年以上枝上者常呈小枝状，可生叶着花，先端有刺。叶近革质，阔倒卵形、倒卵形或椭圆形，长 1—2 厘米，宽 0.8—2.4 厘米，先端圆阔，偶有极浅内凹或急尖，基部近圆形，阔楔形或楔形，边缘有明显圆齿或钝锯齿，侧脉 3—5 对，多为 4 对，细而不甚明显；叶柄极短，长 1—2 毫米。聚伞花序 1 至数花，多为 2—4 次单歧分枝；花序梗细短，长约 5 毫米，分枝及小苞片均细小，三角披针形，长不及 1 毫米；花白色，小，直径仅达 2 毫米；花萼三角卵形；花瓣长方卵形；雄蕊与子房近等高；子房无花柱，柱头 3 裂。蒴果熟时粉红色，3 裂，长 1—1.5 厘米，小果梗长约 3 毫米；种子长方椭圆状（未熟），棕色，假种皮在种子基部，细小。

产于四川西南端（天全、二郎山、金阳）和云南（会泽）。生长于山坡林地边缘。模式标本采自四川金阳。