

- 18. 网脉假卫矛 *M. reticulata* Dunn
18. 叶片较大, 长 5—19 厘米, 宽 2—11 厘米, 两端渐窄; 叶柄较长, 长 5—15 毫米。
20. 叶具 7—11 对侧脉, 直伸不弯; 叶背干后棕赭色; 花序有花 3—7 朵; 蒴果表面平滑不具细疣点 17. 斜脉假卫矛 *M. obliquinervia* Merr. et Freem.
20. 叶具 5—8 对侧脉, 细长弧形; 叶背干后灰棕色; 花序有花 7—15 朵; 蒴果表面具细疣点 19. 异色假卫矛 *M. discolor* Wall.
15. 果实长宽近相等; 叶具侧脉 3—5 对 20. 圆果假卫矛 *M. sphaerocarpus* C. Y. Cheng et T. C. Kao
14. 大或小的团伞花序, 无花序梗或有不显著的短梗; 叶多少肥厚稍带肉质, 干后具不规则细皱点, 少数纸质无皱点。
21. 叶厚纸质, 叶片较小, 长 6—11 厘米; 叶脉明显; 叶面干后无皱点; 花序具 2—7 花。
22. 侧脉较多, 8—11 对, 斜直; 叶柄较短, 长 3—5 毫米; 花 5 数, 通常 2 花 21. 双花假卫矛 *M. biflora* Merr. et Freem.
22. 侧脉较少, 5—8 对, 弧形; 叶柄较长, 长 5—15 毫米; 花 4 数或 5 数, 小花 3—7 朵 22. 逢春假卫矛 *M. oligantha* Merr. et Freem.
21. 叶厚革质, 稍带肉质, 叶片较大, 长 7—18 厘米; 叶脉内隐不显; 叶面干后多少具不规则细皱点; 花序具 5—11 花。
23. 小枝黑紫色; 叶片上下等宽或上部稍宽, 先端急尖或宽短渐尖, 基部渐窄或楔形; 侧脉末端略上升, 叶面叶背颜色无显著差别; 叶柄长 8—15 毫米 23. 隐脉假卫矛 *M. obscurenervia* Merr. et Freem.
23. 小枝棕色; 叶片下部宽, 先端窄急尖, 基部宽楔形; 侧脉斜直; 叶背常锈色; 叶柄长 2.5—5 毫米 24. 木樨假卫矛 *M. osmanthoides* Hand.-Mazz.

组 1. 聚伞圆锥组——Sect. *Cymoso-paniculatae* (Merr. et Freem.) C. Y. Cheng et T. C. Kao. stat. nov. —Ser. *Cymoso-paniculatae* Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 304. 1940.

花序通常具延长的花序轴, 两侧分枝成聚伞圆锥花序, 各级分枝较长而明显, 全花序较疏展; 花 5 数。

组模式: *Microtropis valida* Ridl.

共约 10 种, 多分布于东南亚。我国有 2 种。

1. 大序假卫矛 (植物分类学报) 大明假卫矛 (中国高等植物图鉴) 图版 42: 1—2

Microtropis thyrsoflora C. Y. Cheng et T. C. Kao, 植物分类学报 26 (4): 310. 图 1. 1988.

灌木或小乔木, 高 2—8 米; 小枝圆或在顶端稍扁, 节间短而粗壮, 深紫褐色。叶

革质，长方形或长方椭圆形，稀倒卵椭圆形，长 7—11 厘米，宽 3—5 厘米，先端急尖或短渐尖，基部阔楔形或渐窄，主脉粗壮，两面显著凸起，侧脉 6—8 对；斜伸细直不弯，在近叶缘处结网，叶面深绿色（干后深灰色），叶背灰绿色（干后浅灰色）；叶柄粗壮，长 1—1.2 厘米。聚伞圆锥花序通常侧生，宽大，长 8—9 厘米，宽 7—8 厘米，多为 5 次分枝，各级分枝均粗壮而稍扁；花序梗长 14—18 毫米，花序轴长 10—13 毫米，一次分枝长约 30 毫米，二次分枝长 10—12 毫米，三次分枝长 8—10 毫米，末次分枝长 3—5 毫米；小花梗长约 1 毫米或近无，每次分枝的顶部具 2 个近三角形的苞片，下部苞片较大，长达 2.5 毫米，向上逐渐变小；花蕾近球状，直径 2.5—3 毫米；花 5 数；萼片肥厚近革质，肾圆形；花瓣椭圆形；花盘环形；雄蕊具短花丝，花药近长方形；子房阔圆锥状，花柱短粗。蒴果椭圆状或倒卵椭圆状，长约 18 毫米，直径约 7 毫米，宿存花萼稍增大。

产于广西（大明山）。生长于海拔 2 300 米左右的山顶密林中。模式标本采自广西大明山。

2. 复序假卫矛（植物分类学报） 图版 36: 1—2


Microtropis semipaniculata C. Y. Cheng et T. C. Kao, 植物分类学报 **26** (4): 310. 图 2. 1988.

灌木或小乔木；小枝略四棱形。叶半革质，窄卵形、卵状椭圆形或卵状披针形，长 4.5—9 厘米，宽 1.5—3.5 厘米，先端窄急尖，基部阔楔形或近圆形，边缘略反卷，侧脉细，4—6 对；叶柄长 6—9 毫米。聚伞圆锥花序，腋生或侧生，宽阔开展，有主轴或无主轴，有主轴时则花序梗短，长 2—5 毫米；花序轴长 5—15 毫米，第一次分枝长 12—22 毫米，第二次分枝渐短；小花梗长 2—3 毫米，无主轴时，花序梗则较长，达 2—3 厘米；花白色，5 数，直径约 5 毫米；萼片半圆形，宽 1.5—2 毫米；花瓣开展，长方椭圆形或略倒卵形，长约 3 毫米；花盘环状或近杯状，肥厚肉质，全缘；雄蕊花丝细，长 1.5—2 毫米，花药长方椭圆形；子房窄圆锥状，花柱粗壮，长约 1 毫米。蒴果长椭圆状，长达 2 厘米。

产于广西西南部。生长于海拔 1 200—1 600 米山地密林中。模式标本采自广西睦边（现那坡县）。

组 2. 疏花组 Sect. *Remotiflorae* C. Y. Cheng et T. C. Kao in Addenda p. 205. —Ser. *Oliganthae* Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. **73**: 288. 1940. p. —Ser. *Hexandrae* Merr. et Freem. l. c. **73**: 289. —Ser. *Chlorocarpae* Merr. et Ferrm. l. c. **73**: 290 p. p. —Ser. *Japonicae* Merr. et Ferrm. l. c. **73**: 294. —Ser. *Filiformes* Merr. et Freem. l. c. **73**: 300.

二歧聚伞花序，排列疏展，成帚状，扇状或广展，花序梗长或较长，通常在 1 厘米



图版 42 1—2. 大序假卫矛 *Microtropis thyrsoflora* C. Y. Cheng et T. C. Kao: 1. 果枝, 2. 花序。3. 圆果假卫矛 *M. sphaerocarpus* C. Y. Cheng et T. C. Kao: 果枝。(宗维城绘)