

以上，分枝及小花梗长，至少明显；花5数，稀4数或6数。

组模式：广序假卫矛 *Microtropis petelotii* Merr. et Freem.

我国有10种1变种。

3. 日本假卫矛（新拟） 图版 37: 3—4

Microtropis japonica (Franch. et Sav.) Hall. f. Meded. Rijks. Herb. **1910**: 33. 1911; Kanehira, Formos. Trees ed 2. 395. 1936; Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. **73**: 294. 1940; Nakai in Journ. Jap. Bot. **17**: 376. 1941; H. L. Li et al, Fl. Taiwan. **3**: 633. 1977; Kitamura et al. 原色日本植物图鉴，19次印刷，木本编 **1**: 261, 图 161—1、2、3、4; 图版 50—323. 1983. ——*Eleodendron japonicum* Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. **2**: 315. 1879. ——*Cassine japonica* (Franch. et Sav.) O. Kuntze, Rev. Gen. Pl. **1**: 14. 1891. ——*Otherodendron japonicum* (Franch. et Sav.) Makino in Bot. Mag. Tokyo **23**: 62. f. 1—25. 1909. ——*C. kotoensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. **3**: 61. 1913. ——*Microtropis kotoensis* (Hayata) Koidz. in Bot. Mag. Tokyo **40**: 334. 1926.

常绿小乔木或灌木；小枝光滑，深灰褐色。叶革质，椭圆形、阔椭圆形、菱状椭圆形或卵状椭圆形，长4.5—8厘米，宽2—4厘米，先端钝或钝急尖，有时微内凹，基部楔形或渐窄，下延可达1厘米，边缘稍反卷，侧脉4—6对，斜直，距叶缘较远处结网；叶柄长2—12毫米。聚伞花序腋生或顶生及腋生同时存在；花序梗长10—15毫米，通常为2—3次二歧分枝，稀为四次分枝，第一次分枝长1—4厘米，二次以下依次渐短，各次中央小花均无梗，最末两侧小花梗短或长达2.5毫米；花5数，开放时直径约5毫米，黄白色；萼片厚，阔半圆形，长1—1.5毫米，宽2—2.5毫米，边缘具不整齐细齿，果期宿存；花瓣稍肉质，长方椭圆形，长约3毫米；花盘环状，肉质，极浅5钝裂；雄蕊具极短花丝，着生花盘边缘；雌蕊具短粗花柱。蒴果长方椭圆状，长1.5—2厘米，直径0.7—1厘米，顶端短尖细小，表面具细纵棱线；种子倒卵椭圆状，长1—1.2厘米，表面朱红色或暗红色。花期约在4月。

产于我国台湾（兰屿岛）。生长于林中。多分布于日本中部、南部及琉球等地。模式标本采自日本。

4. 大叶假卫矛（新拟） 大果假卫矛（植物分类学报） 图版 36: 3

Microtropis macrophyllus Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. **73**: 229. 1940. ——*M. macrocarpa* C. Y. Cheng et T. C. Kao 植物分类学报 **26** (4): 313. 1988. syn. nov.

灌木，高1.5—3米；小枝较细，直径1.3毫米，棕褐色。叶纸质，长方形或长椭圆形，长8—15厘米，宽3.5—7厘米，先端圆阔，中央具窄长尖尾，尾长11—15毫米，宽1—2毫米，基部阔楔形或宽阔而渐窄，全缘，叶面黄绿色，叶背绿色，主脉细



图版 37 1—2. 六蕊假卫矛 *Microtropis hexandra* Merr. et Freem: 1. 花枝, 2. 花放大。3—4. 日本假卫矛 *M. japonica* (Franch. et Sav.) Hall. f. 3. 花枝, 4. 果枝。5. 小花假卫矛 *M. micrantha* (Hayata) Koidz.:

花枝 (宗维城绘)