

裂片圆阔；花丝显著，长可达1毫米，花药长宽近相等；子房窄卵状，花柱粗壮。蒴果阔椭圆形，长约1.5厘米，直径5—6毫米。

产于海南。生长于海拔1000米左右山上密林中。模式标本采自海南。

本种与方枝假卫矛 *M. tetragona* Merr. et Freem. 较近，但本种叶较小，长3.5—7厘米，宽1.5—3.5厘米，先端为急尖状渐尖，侧脉较少，4—7对，花盘浅杯状，裂片较深；雄蕊花丝明显，长1毫米；蒴果较小，长约1.5厘米，主要分布海南。而后者叶较大，长8—13厘米，宽2.5—5厘米，先端为渐尖形，侧脉6—9对，花盘浅裂或不裂，雄蕊无明显花丝，分布于广西及云南。

9. 方枝假卫矛 图版 38: 1—2

Microtropis tetragona Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 290. 1940; 中国高等植物图鉴 2: 663, 图 3056. 1972.

灌木或小乔木；小枝具明显四棱，表面紫褐色。叶纸质或半革质，长方椭圆形或卵状窄椭圆形，长8—13厘米，宽2.5—5厘米，先端渐尖，稀镰状渐尖，基部楔形，侧脉6—9对，较细弱成弧形上升；叶柄长5—10毫米。聚伞花序有花3—7朵，稀稍多，疏散开展；花序梗细，长5—11毫米，分枝长3—5毫米；小花梗长1.5—3毫米；花5数；花萼裂片近半圆形；花瓣长方椭圆形或稍倒卵阔椭圆形；花盘薄环状，5浅裂或不裂；雄蕊短小，无明显花丝；子房宽三角卵状，柱头常4裂。蒴果近长椭圆状，长约2厘米，直径8—9毫米，顶端常具短喙，果皮外面具细棱线。

产于广西稍靠南部、云南东南部。生长于海拔1000—2000米林中或近溪边。模式标本采自广西平南。

10. 滇东假卫矛 (中国高等植物图鉴补编)

Microtropis henryi Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 289. 1940; 中国高等植物图鉴补编 2: 247. 图 8825. 1983.

灌木，高2—3米。叶薄纸质或纸质，窄椭圆形或窄长方椭圆形，长9—15厘米，宽3—5厘米，先端渐尖或窄渐尖，基部楔形，侧脉5—8对，细长，弧形上升；叶柄长6—12毫米。聚伞花序侧生或腋生，十分开展，3—7花，有时只具1花；花序梗长5—8毫米，分枝长3—5毫米；小花梗长1—3毫米或不明显；萼片4，稀5，外面两片较小，肾状半圆形，边缘具不整齐细齿；花瓣5—6片，阔椭圆形或倒卵圆形；花盘不明显；雄蕊通常6，花丝较短，花药长方形，药隔顶部形成小凸尖；子房长方卵状，花柱不明显或近无。蒴果宽椭圆状，长1.3—1.7厘米，直径8—10毫米，顶部圆，中央具1小凸头，果皮较平滑。

产于云南东南部。生长在海拔1000—1500米密林较湿土壤中。模式标本采自云南蒙自。原始记载是根据果期标本有4宿萼而判断花为4数的。实际本种花部的数目有时有变化。



图版 38 1—2. 方枝假卫矛 *Microtropis tetragona* Merr. et Freem: 1. 花枝, 2. 果。3—4. 灵香假卫矛 *M. submembranacea* Merr. et Freem: 3. 花果枝, 4. 果枝。(宗维城绘)