

花瓣倒卵椭圆形，长约3毫米，盛开时外展；花盘杯状，稍肉质，裂片弧形；雄蕊长约2毫米；子房略呈瓶状，柱头明显。蒴果倒卵椭圆状，长约1.5厘米；种子亦倒卵椭圆状，红棕色。

产于湖北、四川、贵州及云南。生长于海拔1300—2100米林中或山坡林缘。模式标本采自四川南川。

本种与福建假卫矛 *M. fokienensis* Dunn 外形较相似，但本种叶片较窄长，最宽部分在中部，先端成渐长渐尖形，聚伞花序具长梗，两侧小花具细长明显小花梗。而后的叶较宽短，最宽部分在上部，先端成窄急尖，稀近短渐尖，密伞花序具短梗，长1.5—5毫米，小花梗短近无。

12b. 阔叶三花假卫矛 (变种)

Microtropis triflora Merr. et Freem. var. *szechuanensis* C. Y. Cheng et T. C. Kao, 植物分类学报 26 (4): 315. 1988.

本变种的主要特征为叶宽阔，成椭圆形或长方椭圆形，长5—8厘米，宽2—4厘米，叶基通常为阔楔形，花盘较浅，成环状。

产于四川省中南部。模式标本采自四川嘉定（今乐山）。

组3. 密花组 Sect. *Microtropis*—Ser. *Ramiflorae* Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 281. 1940. —Ser. *Paucinerviae* Merr. et Freem. l. c. 285. —Ser. *Reticulatae* Merr. et Freem. l. c. —Ser. *Oliganthae* Merr. et Freem. l. c. 288, p. p. —Ser. *Chlorocarphae* Merr. et Freem. l. c. 290. p. p. —Ser. *Discolores* Merr. et Freem. l. c. 292. —Ser. *Confertiflorae* Merr. et Freem. l. c. 320.

花序通常无花序梗或有短梗，稀有较长梗，花序多无分枝或仅有较短分枝，小花梗无或极短，使整个花序常呈球状或带梗球状。

我国有12种。

组模式：异色假卫矛 *Microtropis discolor* Wall.

13. 密花假卫矛 (中国高等植物图鉴补编)

Microtropis gracilipes Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 14: 88. f. 6. 1937; 中国高等植物图鉴补编 2: 244 (在检索表中) 1983. —*M. gracilipes* Merr. et Metc. var. *parvifolia* Merr. et Metc. l. c. 14: 88. 1937. —*M. confertiflora* Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 70: 302. 1940, excl. specim. J. S. Tsoong 83555; 中国高等植物图鉴 2: 663. 1972, syn. nov.

灌木，高2—5米；小枝略具棱角。叶近革质，阔倒披针形、长方形、长方倒披针形或长椭圆形，长5—11厘米，宽1.5—3.5厘米，先端渐尖或窄渐尖，基部楔形，边