

1948; 陈嵘, 中国树木分类学修订版 668. 1953; D. Hou in Fl. Males. Ser. 1, 6 (2), 1: 275. 1962. — *Cassine discolor* Wall. in Roxb. Fl. Ind. 2: 378. 1824. — *Microtropis sessiliflora* Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 284. 1940; 中国高等植物图鉴补编 2: 250. 图 8829. 1983. syn. nov.

灌木或小乔木, 高 2.5—7 米。叶厚纸质或近革质, 长方形或长椭圆形, 有时近阔披针形或倒卵窄椭圆形, 长 7.5—19 厘米, 先端尾状渐尖, 尾长达 1.5 厘米, 基部楔形或阔楔形, 主脉两面突起, 下面尤其明显, 侧脉 5—8 对, 细长弧形, 两面凸起, 通常干后叶面灰绿色, 叶背灰棕色; 叶柄长 5—10 毫米。团伞花序腋生或侧生, 小花多为 7—15 朵; 花序梗短, 长 2.5—6 毫米, 一次分枝长 1.5—2.5 毫米或不甚明显, 二次分枝长约 1 毫米或不明显; 小花梗极短; 花 5 数; 萼片略呈半圆形, 覆瓦状排列, 边缘具深褐色不整齐细齿; 花瓣稍肉质, 长方形, 长 2.5—3.5 毫米, 宽 1.5—2.5 毫米, 内侧中央具纵向脊状隆起; 花盘环状; 雄蕊花丝长 1.5—2.5 毫米, 花药长方形; 子房椭圆卵状, 无明显花柱, 柱头 4 裂。蒴果阔椭圆状, 长 10—14 毫米, 直径 8—10 毫米, 果皮表面具细疣点形成的纵棱线。

产于云南省南部。生长于海拔 800—1 500 米地带。分布于印度、缅甸、越南、泰国及马来西亚。模式标本采自印度。

20. 圆果假卫矛 (植物分类学报) 图版 42: 3

Microtropis sphaerocarpa C. Y. Cheng et T. C. Kao, 植物分类学报 26 (4): 314, 图 6. 1988.


小灌木, 高 2—3 米; 小枝无棱略扁。叶纸质, 椭圆形或近长方椭圆形, 长 6—9 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端短渐尖或渐尖, 基部渐窄, 侧脉 3—5 对, 弧形上升, 纤细, 于叶背突起; 叶柄由叶基下延而成短柄, 长 3—5 毫米。团伞花序, 有花 1—3 朵, 稀多达 7 朵; 花序梗长 3—5 毫米; 小花梗极短或无; 花 4 数; 萼片肉质, 圆阔, 边缘棕褐色, 有不整齐小齿。蒴果近圆球状, 直径约 9 毫米, 果皮较光滑平坦, 无明显纵棱线。

产于云南西北部。生长于海拔 1 200 米左右之林缘处。模式标本采自云南佤江 (属贡山)。

21. 双花假卫矛 (中国高等植物图鉴补编) 图版 41: 4—6

Microtropis biflora Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 288. 1940; 中国高等植物图鉴补编 2: 251. 图 8832. 1983.

灌木, 高约 2 米; 小枝圆柱状, 通常灰白色, 节间较细长, 一般长 4—8.5 厘米。叶厚纸质, 干时两面均暗灰色, 卵状长椭圆形或长方椭圆形, 长 6—10.5 厘米, 宽 1.8—4.5 厘米, 先端渐尖或窄渐尖, 基部阔楔形, 脉细, 侧脉 8—11 对, 斜向直伸; 叶柄长 3—5 毫米。花序顶生、腋生或侧生, 通常 2 花, 稍稍多, 一般为白色或淡黄色; 花序梗不明显到长仅 1.5 毫米, 无小花梗; 花 5 数; 萼片不甚开展; 花瓣长方形, 有时



图版 42 1—2. 大序假卫矛 *Microtropis thyrsoflora* C. Y. Cheng et T. C. Kao: 1. 果枝, 2. 花序。3. 圆果假卫矛 *M. sphaerocarpus* C. Y. Cheng et T. C. Kao: 果枝。(宗维城绘)