

上部较宽，长约3毫米；雄蕊短，花丝长近1毫米；子房卵圆状，有短粗花柱。蒴果阔椭圆状，长1.3—1.5厘米，直径约9毫米。花期12月到翌年早春，果熟期冬季。

产于广东中部。多生长于海拔约250米处密林中。模式标本采自广东罗浮山。

22. 逢春假卫矛 (新拟)

Microtropis oligantha Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 285. 1940.

灌木；小枝细长圆柱状，节间长3—10厘米，紫褐色。叶厚纸质，干后叶面橄榄色，叶背暗灰白色，长方椭圆形，长8—11厘米，宽3—4厘米，先端渐尖或尾状渐尖，基部楔形，侧脉5—8对，细长弧形；叶柄长0.5—1.5厘米。团伞花序腋生，小花3—7朵；花序梗长不及1毫米，亦无明显小花梗；花4数或5数；萼片较肥厚，近半圆形或肾形，宽1.5—2毫米；花瓣长方椭圆形或椭圆形，长3.5毫米，宽1.5—1.8毫米；花盘环状；雄蕊花丝长1毫米，花药椭圆状，长0.5毫米；子房三角卵圆状，花柱极短，柱头2浅裂。果实未见。

产于云南东南部。生长于海拔1000米左右地区。模式标本采自云南逢春岭（红河南部）。

23. 隐脉假卫矛 (海南植物志) 图版43: 2—3

Microtropis obscurinervia Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 283. 1940. ——*M. latifolia* auct. non Wight ex Laws.: 陈嵘，中国树木分类学，修订版，668. 1953；中国高等植物图鉴补编2: 251. 图8831. 1983.


常绿灌木，高1—2米；小枝紫褐色或黑色或黑紫色。叶革质，较肥厚，干后有不规则的细疣点，窄长方形、窄长方椭圆形或阔倒披针形，长8—18厘米，宽2.5—7厘米，主脉在背面凸起，侧脉7—11对，斜向直伸，内含不明显；叶柄粗壮，长8—15毫米。团伞花序，有花十余朵，近无花序梗，无小花梗；花白色（据野外记录），5数，开放后略呈壶状，长4—5毫米；花萼厚革质，萼片近圆肾形，长1.2—1.4毫米；花瓣长方形，长2.5—3毫米，基部具短爪；花盘薄，环状，全缘不裂；子房近卵状，花柱短粗，柱头不明显2浅裂。蒴果椭圆状或近椭圆卵状，长1.5—2厘米；种子卵状椭圆形，长约1.5厘米。

产于海南。生长于海拔800—1500米山谷林中。模式标本采自海南保亭。

24. 木樨假卫矛 (中国高等植物图鉴补编) 图版43: 1

Microtropis osmanthoides Hand.-Mazz. in Sinensia 3: 189. 1933; Merr. et Freem. in Proc. Am. Acad. 73: 284. 1940; C. H. Wang, in Contrib. Bot. Surv. N.-W. China 1 (1): 55. 1939; 中国高等植物图鉴补编2: 250. 图8829. 1983. ——*Chin-githamnus osmanthoides* Hand.-Mazz. l. c. 2: 128. 1932.

灌木，高达6米；小枝棕色或灰棕色。叶革质，肥厚，叶面有光泽，干后浅灰绿色，有细皱点，叶背干后灰棕色或浅锈色，卵形、阔卵形或卵状披针形，长7—13厘



图版 43 1. 木樨假卫矛 *Microtropis osmantoides* Hand.-Mazz.: 果枝。2—3. 隐脉假卫矛 *M. obscurenervia* Merr. et Freem: 2. 花枝, 3. 果枝。(宗维城绘)