

下分 2 族：福木族 Tribe Cassineae 和核子木族 Tribe Perrottetieae，中国全产。

分族检索表

1. 花冠花萼异形；子房与花盘大部合生；核果或不裂蒴果；种子无假种皮……………
 ……………… 1. 福木族 Tribe Cassineae
1. 花冠花萼形态相似；子房与花盘分离；浆果；种子具薄假种皮 …… 2. 核子木族 Trib. Perrottetieae

族 1. 福木族 TRIB. CASSINEAE Loes.

Loes. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. 3 (5): 213. 1892; et
 ed. 1942. 20B: 171. 1942.

花萼花冠有明显区分，子房与花盘大部合生，核果或干燥不裂蒴果，种子无假种皮。

族模式：福木属 *Cassine* L.

约 20 属，我国产 1 属。

11. 盾柱属 *Pleurostyli* Wight et Arn.

Wight et Arn. Prod. Fl. Pennis. Ind. Or. 1: 157. 1834; 侯宽昭，
 中国种子植物科属辞典，修订版，385, 1982.

常绿乔木或灌木。叶无托叶。花小，通常组成腋生短小 1—2 次分枝聚伞花序；花 5 数，萼片 5，花瓣 5，花盘杯状，雄蕊 5，着生花盘外缘之下，子房不与花盘愈合，2 室或退化为 1 室，每室 2 胚珠，但只一室 1 胚珠发育成熟，花柱极短粗，柱头盾状，随花开增长而向子房偏侧移位。果熟时不开裂，果顶一侧有柱头遗迹，果皮革质，内果皮稍肉质包围种子，种子通常 1，极稀为 2。

属模式：盾柱 *Pleurostyli opposita* (Wall.) Alston [*Celastrus opposita* Wall., *Pleurostyli heynei* Wight et Arn.]

本属约 4 种，分布在非洲南部、马达加斯加和南亚一带温暖地区。我国有 1 种。

1. 盾柱 (中国高等植物图鉴) 图版 46: 1—4

Pleurostyli opposita (Wall.) Alston in Trimen, Handb. Fl. Ceylon. Suppl 48. 1931; 中国高等植物图鉴 2: 685. 图 3100. 1972. — *Celastrus opposita* Wall. in Roxb. Fl. Ind. ed Carey 2: 898. 1824. — *Pleurostyli heynei* Wight et Arn. Prod. Penn. Ind. Or. 1: 157. 1834. — *P. wightii* Wight et Arn. 1. c. 1834. — *P.*