

绿色,沿中脉及侧脉具簇生的白色毛,网脉不隆起,顶生小叶柄长1.5—4厘米,侧生小叶柄短,长仅3—8毫米,近无毛。核果近球形或椭圆状球形,直径5—6毫米。

产湖北(利川)、四川(万县)。

2. 省沽油属——*Staphylea* L.

L., Sp. Pl. ed. 1: 270. 1753.

落叶灌木或小乔木;叶对生,有托叶,小叶3—5或羽状分裂,具小托叶,圆锥花序或为腋生总状花序,花白色,下垂,花整齐,两性,花萼5,等大,脱落,覆瓦状排列,花瓣5,直立,与花萼近等大,覆瓦状排列,花盘平截,花萼被毛,边缘具不相连的裂齿,雄蕊5,等大,直立,子房基部2—3裂,裂片全裂,或稀叉齿状,连合为一室,花柱多数,分离或连合,柱头头状,胚珠多数,侧生于复缝线上,成二列。蒴果薄膜质,小泡状膨大,2—3裂,2—3室,每室1—4种子;种子近圆形,无假种皮,胚乳肉质,子叶扁平。

约11种,产欧洲、印度、尼泊尔至我国及日本、北美洲。我国有4种。

分 种 检 索 表

1. 顶生小叶柄短,长仅1厘米,蒴果扁平,2裂。……………1. 省沽油 *S. bumalda* DC.
1. 顶生小叶柄较长,长1.5—4厘米,蒴果3(—4)裂
 2. 广展的伞房花序,叶长圆状披针形至狭卵形,近革质。……………2. 膀胱果 *S. holocarpa* Hemsl.
 2. 总状花序。
 3. 叶线状披针形,两面无毛,膜质。……………3. 腺齿省沽油 *S. shweliensis* W. W. Smith
 3. 叶长圆状椭圆形,纸质,叶背向基部脉腋疏生白色微柔毛。…4. 嵩明省沽油 *S. forrestii* Balf. f.

1. 省沽油 水条(辽宁) 图版5: 1—3

Staphylea bumalda DC. Prodr. 2: 2. 1825; Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1: 180. t. 95. 1826—35; Wils. in Sarg. Pl. Wils. 2: 185. 1916; Nakai in Tokyo Bot. Mag. 44: 17. 1930; Kitagawa, Lineam. Fl. Mansh. 309. 1939; 中国高等植物图鉴2: 690. 图3110. 1972.—*Bumalda trifolia* Thunb. Nov. Gen. Pl. 2: 63. 1783 et Fl. Jap. 114. 1784.

落叶灌木,高约2米,稀达5米,树皮紫红色或灰褐色,有纵棱;枝条开展,绿白色。复叶对生,有长柄,柄长2.5—3厘米,具三小叶;小叶椭圆形、卵圆形或卵状披针形,长(3.5—)4.5—8厘米,宽(2—)2.5—5厘米,先端锐尖,具尖尾,尖尾长约1厘米,基部楔形或圆形,边缘有细锯齿,齿尖具尖头,上面无毛,背面青白色,主脉及侧脉有短毛;中间小叶柄长5—10毫米,两侧小叶柄长1—2毫米。圆锥花序顶生,直立,花白色;萼片长椭圆形,浅黄白色,花瓣5,白色,倒卵状长圆形,较萼片稍大,长5—7毫米,雄蕊5,与花瓣略等长。蒴果膀胱状,扁平,2室,先端2裂;种子黄色,有光泽。花期4—5月,果期8—9月。