

1. **野鸦椿** 酒药花、鸡肾果(广西),鸡眼睛(四川),小山辣子、山海椒(云南),芽子木(湖南),红棕(湖北、四川) 图版 6

Euscaphis japonica (Thunb.) Dippel in Termesztet. Fuzet. 3:157. 1878; Dippel Laubholzk. 2: 480. fig. 229. 1892; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 665-1933; 中国高等植物图鉴 2: 690. 1972; 云南植物志 2: 354. 1979.——**Sambucus japonica** Thunb. Fl. Jap. 125. 1784.——**Euscaphis staphyleoides** Sieb. et Zucc. Fl. Jap. 1: 124. f. 67. 1835.——**Euscaphis konishii** Hayata in Ic. Pl. Formos. 3: 67. 1913.——**Evodia chaffanjonii** Lévl. in Fedde, Rep. 13: 265. 1914.——**Euscaphis japonica** var. **ternata** Rehd. in Journ. Arn. Arb. 3: 215. 1922.——**Euscaphis chinensis** Gagn. in Not. Syst. Paris 13: 191. 1948.

落叶小乔木或灌木,高(2—)3—6(—8)米,树皮灰褐色,具纵条纹,小枝及芽红紫色,枝叶揉碎后发出恶臭气味。叶对生,奇数羽状复叶,长(8—)12—32厘米,叶轴淡绿色,小叶5—9,稀3—11,厚纸质,长卵形或椭圆形,稀为圆形,长4—6(—9)厘米,宽2—3(—4)厘米,先端渐尖,基部钝圆,边缘具疏短锯齿,齿尖有腺体,两面除背面沿脉有白色小柔毛外余无毛,主脉在上面明显,在背面突出,侧脉8—11,在两面可见;小叶柄长1—2毫米,小托叶线形,基部较宽,先端尖,有微柔毛。圆锥花序顶生,花梗长达21厘米,花多,较密集,黄白色,径4—5毫米,萼片与花瓣均5,椭圆形,萼片宿存,花盘盘状,心皮3,分离。蓇葖果长1—2厘米,每一花发育为1—3个蓇葖,果皮软革质,紫红色,有纵脉纹;种子近圆形,径约5毫米,假种皮肉质,黑色,有光泽。花期5—6月,果期8—9月。

除西北各省外,全国均产,主产江南各省,西至云南东北部。日本、朝鲜也有。

木材可为器具用材,种子油可制皂,树皮提烤胶,根及干果入药,用于祛风除湿。也栽培作观赏植物。

2. 福建野鸦椿

Euscaphis fukienensis Hsu in Act. Phytotax. Sin. 11: 2. 196. 1966.

灌木,高约1.5米,无毛,小枝纤细,一年生小枝绿褐色,幼芽被芽鳞3(外2内1),卵形,具缘毛。奇数羽状复叶,对生,叶轴圆柱形,长3—5厘米,上面有槽,小叶(5—)7—11,膜质,椭圆形或卵状椭圆形或长圆状披针形,长6—8厘米,宽2—3厘米,先端突尖,尖头长7—15毫米,基部宽楔形或近圆形,顶生小叶长,边缘具细圆齿,上面绿色,叶脉隆起,下面苍白,侧脉5—7,顶生小叶柄长1—2厘米,基部具2托叶,早脱;侧生小叶柄长4—7毫米。伞房式的聚伞花序顶生,花未见。果序长约10厘米,果密集,1—3心皮,蒴果,长5—10毫米,绿色,干后稍红色,革质,先端具短尖,果柄长约3毫米,萼5浅裂,裂片长圆形,长约2毫米;种子1—3,近圆形,压扁,径约5毫米,黑色。

产福建(南靖、平和、永泰、南平)。