

萼5(4),长圆形或卵状长圆形,长2—3毫米,花瓣黄白色或白色,长3—4毫米,雄蕊5(4),子房卵圆形或圆形,无毛,3室,花柱单一,具长柔毛,柱头3—4裂,果皮肉质,橙黄色,长圆状球形或卵圆形,长约1厘米,种皮深黑色带深褐色,具光泽。

产我国台湾(阿里山)。日本南部和琉球群岛也有。

8. 大果山香圆

Turpinia pomifera (Roxb.) DC. Prod. 2: 3. 1825; Hook. f., in Fl. Brit. Ind. 1: 698. 1874. 云南植物志 2: 358. 1979. — *Dalrymplea pomifera* Roxb. Hort. Beng. 17. 1814, nom. nud. — *Turpinia nepalensis* Wall. in For. Fl. Burma, 1: 292. 1911.

8a. 大果山香圆 图版9: 1—3

Turpinia pomifera (Roxb.) DC. var. *pomifera*

乔木,高8(—15)米,或灌木;小枝灰色,无毛,节处膨大。奇数羽状复叶,长15—50厘米,托叶在二对生叶柄之间,三角形,脱落;小叶3—9,薄革质,矩圆状椭圆形,稀近卵形,长8—14(—20)厘米,宽(2.5—)5—7(—8)厘米,先端尖或钝,有突尖,基部常宽楔形,边缘有锯齿,两面无毛,侧脉7—8(—9),连同网脉在两面明显可见,网脉近平行,顶生小叶柄长达5厘米,侧生小叶柄长仅5—15毫米,小托叶披针状圆形至近卵形,脱落。圆锥花序顶生,花序短于叶,长至多21厘米,较粗壮,花大,长3.5—4毫米,花药长圆状披针形,常长渐尖。果大,径1.5—2.5厘米,幼果果皮粗糙,成熟时厚达2—5毫米。花期1—4月,果期6—8月,10月尚存。

产云南南部。海拔350—650米的杂木林中、路旁、林边。印度、越南北部也有。

8b. 山麻风树 小香圆(云南景洪)

Turpinia pomifera (Roxb.) DC. var. *minor* C. C. Huang 云南植物志 2: 358. 1979.

与原变种的区别在于果小,径仅达1厘米。

产云南南部、广西(扶绥、德保)。生于海拔740—1400(—1500)米的密林中。

果子很甜。

9. 卵叶山香圆

Turpinia ovalifolia Elmer in Leaf. Philip. Bot. 2: 490. 1908; Merr. & Perry in Journ. Arn. Arb. 32: 549. 1941; Hui-Lin Li, Woody Flora of Taiwan 480. 1963. — *Turpinia lucida* Nakai in Journ. Arn. Arb. 5: 80. 1924. — *Turpinia pachyphylla* Merr. in Philip. Journ. Sci. 27: 33. 1925.

乔木,小枝圆柱形,干后褐色,径约8毫米。叶为1—3(—5)小叶,长约25厘米,小叶椭圆形,薄革质,先端明显渐尖,基部宽楔形至圆形,边缘有暗色的具腺体的锯齿,上面橄榄绿色,下面较淡,长12—15厘米,侧脉6对,弯拱,平行,上升,网脉明显;叶柄长10—14毫