

10. 花两性, 排列成聚伞花序。..... 9. 无须藤属 *Hosiera* Hemsl. et Wils.
 10. 花单性, 穗状或总状花序。
 11. 无花瓣; 花排列成穗状花序。..... 10. 刺核藤属 *Pyrenacantha* Hook. ex Wight
 11. 具花瓣; 花排列成总状花序。
 12. 花萼 5 裂; 花瓣分离; 叶疏生细齿, 具掌状脉; 总状花序腋上生。.....
 11. 薄核藤属 *Natsiatum* Buch.-Ham. ex Arn.
 12. 花萼 4 裂; 花瓣下面 2/3 连合成管, 裂片分离; 叶边缘波状, 侧脉延伸成小尖突; 总状花序数个簇生叶腋。..... 12. 麻核藤属 *Natsiatopsis* Kurz.
 7. 草质藤本, 具白色乳汁; 果具阔而多横纹的膜质翅。..... 13. 心翼果属 *Peripterygium* Hassk.

1. 肖榄属——*Platea* Bl.

Bl. in Bijdr. 646. 1826.

大乔木; 嫩枝、幼叶背面及花序被锈色星状鳞秕或单毛。叶全缘, 革质, 平行羽状脉。花小, 杂性或雌雄异株, 雄花为腋生、间断的穗状花序, 或复组成圆锥花序; 雌花为腋生短总状花序。萼片 5, 分离或基部稍连合, 覆瓦状排列; 花瓣 5, 基部合生成极短的管, 先端分离, 裂片镊合状排列, 在雌花中极早落或无; 雄蕊 5, 着生于花冠基部, 与花冠裂片互生, 花丝比花药短, 花药外向; 子房 (在雄花中退化或无) 球形至圆柱形, 被毛, 柱头阔盘状, 1 室, 具 2 悬垂胚珠。核果圆柱状, 外果皮蓝黑色, 薄, 内果皮木质, 具网状肋。种子 1 枚, 具丰富胚乳及微小的胚。

本属约 5 种, 分布自锡金向东南亚、马来西亚、印度尼西亚, 东达菲律宾。我国产 2 种, 分布于广东、广西、云南。

分种检索表

1. 叶大, 长 10—19 厘米, 宽 4—9 厘米, 基部圆或钝, 叶柄长 2—3.5 厘米; 核果长 3—4 厘米, 径 1.5—2 厘米。..... 1. 阔叶肖榄 *P. latifolia* Blume
 1. 叶小, 长 6—10 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 基部阔楔形, 叶柄长 1—1.5 厘米; 核果长约 3 厘米, 径约 1.5 厘米。..... 2. 东方肖榄 *P. parvifolia* Merr. & Chun

1. 阔叶肖榄 海南肖榄 (海南), 木棍树 (广西), 蒜头树 (云南) 图版 10: 1—4

Platea latifolia Blume, Bijdr. 647. 1826; Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 44. 1938; Chun in Sunyatsenia 4: 229. 1940; Gagn. in Lecte. Fl. Gen I.-C. Suppl. 754. 1948; Sleum. in Blumea 17: 243. 1969; 云南植物志 1: 162, 图 39, 1—4. 1977. — *Sideroxylon gamblei* C. B. Clarke in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 3: 538. 1882. — *Platystigma myristiceum* R. Br. (in Wall., Cat. n. 7523, 1832 nom. nud.) ex Hook. f., Ic. Pl. 18, t. 1707. 1887. — *Platea hainanensis* Howard in Lloydia 6: 149, Pl. 2. 1943; Dahl in Journ. Arn. Arb. 33: 261. 1952; 海