

南植物志 2: 449, 图 512. 1965; 中国高等植物图鉴, 2: 695, 图 3119. 1972.——*Platea parviflora* (non K. et V.) Dahl in Journ. Arn. Arb. 33: 261. 1952 (Pollen).

大乔木, 高 6—25 米; 小枝、芽、幼叶背面及花序密被锈色星状鳞秕, 老时渐疏, 树皮灰褐色。叶椭圆形或长圆形, 长 10—19 厘米, 宽 4—9 厘米; 先端渐尖, 基部圆或钝, 表面深绿色, 背面淡绿, 薄革质至革质, 中脉在表面微凹, 背面与侧脉均隆起, 侧脉 6—14 条, 在边缘汇合, 网脉细而略明显; 叶柄长 2—3.5 厘米。雌雄异株。雄花为大型圆锥花序, 腋生, 长 4—10 厘米, 密被锈色星状鳞秕和绒毛; 具苞片, 卵形, 长约 1 毫米, 被锈色绒毛; 萼片卵形, 长约 0.5—0.8 毫米, 密被锈色星状鳞秕, 具缘毛; 花瓣卵状椭圆形, 长 1.5—1.8 毫米, 先端内弯, 绿色, 无毛; 花丝极短, 白色, 花药长圆形, 长约 0.8 毫米, 黄色; 退化子房圆锥状。雌花为腋生短总状花序, 长 1—2 厘米, 和苞片、萼片及子房密被锈色星状鳞秕和绒毛; 每花具 1 披针形的苞片, 长 0.4—0.7 厘米; 花梗粗, 长 0.3—0.4 厘米; 萼片长约 0.3 厘米, 5 齿, 裂齿三角形, 外面密被锈色星状毛, 里面无毛, 边缘具缘毛; 子房圆柱形, 密被棕色星状毛, 柱头盘状, 3 圆裂。果序长 1.5—3 厘米, 被锈色星状鳞秕; 核果椭圆状卵形, 长 3—4 厘米, 径 1.5—2 厘米, 幼时被星状鳞秕, 老时逐渐脱落, 顶端为盘状柱头, 具增大的宿存萼。种子 1 枚, 子叶披针形, 胚乳丰富。花期 2—4 月, 果期 6—11 月。

产云南(屏边)、广西、广东(海南)。生于海拔 900—1300 米的沟谷密林中。锡金、孟加拉、泰国、老挝、越南、马来半岛、印度尼西亚、菲律宾也有。

2. 东方肖榄

Platea parvifolia Merr. et Chun in Sunyatsenia 5: 112, pl. 15. 1940; 海南植物志 2: 450. 1965; Sleum. in Blumea 17: 244. 1969.

乔木, 高 8—18 米; 树皮灰褐色, 小枝无毛, 嫩枝密被锈色或灰褐色星状鳞秕。叶长椭圆形, 长 6—10 厘米, 宽 2.5—4 厘米, 先端钝, 基部阔楔形, 表面深绿色, 背面淡绿, 幼时被锈色星状鳞秕, 老叶背面有极稀疏、脱落的星状鳞秕痕迹, 革质或薄革质, 中脉在表面微凹, 背面隆起, 侧脉 6—7 对, 背面微凸起, 网脉不明显; 叶柄长 1—1.5 厘米, 上面具一槽, 幼时密被星状鳞秕。总状花序腋生, 花芽微红绿色。雄花排列成腋生多花圆锥花序, 花未见。雌花排列成腋生少花总状花序, 长约 1 厘米, 和苞片、萼片及子房密被锈色星状鳞秕和绒毛, 苞片卵形, 长约 2 毫米, 萼片长约 2 毫米, 裂齿三角形, 子房圆柱形, 柱头盘状。核果椭圆状卵形, 长约 3 厘米, 径约 1.5 厘米, 顶端钝形, 青色, 干时黑褐色; 果柄长 1—1.5 厘米; 宿萼 5, 卵形, 长约 2 毫米, 被锈色星状鳞秕。花期 2 月以后, 果期 10 月。

广东海南特产, 仅见于东方等地。生于海拔 700—900 米的林中。

2. 粗丝木属——*Gomphandra* Wall. ex Lindl.

Wall. ex Lindl. in Not. Syst. ed. 2: 439. 1836.

乔木或灌木。单叶互生, 具柄, 全缘, 无托叶。雌雄异株, 花小, 排列成腋生、顶生或对