

产云南沧源至西双版纳、红河、金平。生于海拔 350—1600 米的山溪密林中。缅甸、泰国、老挝至越南北部也有分布。

种子可食，又云作药用。

6. 假柴龙树属——*Nothapodytes* Bl.

Bl. in Mus. Bot. Lugd. Bat. 1: 248. 1850.

乔木或灌木；小枝通常具棱。叶互生，稀上部近对生，全缘，羽状脉；叶柄具沟槽。聚伞花序或伞房花序顶生，稀同时腋生；花常有特别难闻的臭气，两性或杂性，花梗在萼下具关节，无苞片。萼小，杯状或钟状，浅 5 齿裂，宿存；花瓣 5，厚，条形，镊合状排列，外面被糙伏毛，里面被长柔毛，先端反折，通常无毛；雄蕊 5，通常分离，花丝丝状，肉质，通常扁平，稀基部加厚，花药卵形，纵裂，内向，背着，背面基部的垫状附属物多少与花丝贴生，药隔长约为花药之半；花盘叶状，环形，内面被毛，具 5—10 圆裂或齿缺；子房被硬毛，稀无毛，1 室，有 2 倒生胚珠，自近室顶下垂，花柱丝状至短圆锥形，柱头头状，截形，稀 2 裂或凹入。核果小，椭圆形或卵圆形、长圆状倒卵形，浆果状，中果皮肉质，内果皮薄，核薄。种子 1，胚乳丰富，子叶薄而叶状，几与种子等长，胚根直出。

本属有 7 种，分布于印度南部及东北部、斯里兰卡、缅甸、泰国、柬埔寨、越南、马来西亚、印度尼西亚（最东达松巴哇岛）和菲律宾（吕宋北部）、日本（琉球）；我国产 6 种，分布于云南、甘肃、四川、贵州、湖北、湖南、广西、广东、台湾（兰屿）。

分 种 检 索 表

1. 叶片两面无毛，通常较大。
 2. 叶片先端钝或圆，果长圆状倒卵形。产海南。……………1. 假柴龙树 *N. obtusifolia* (Merr.) Howard
 2. 叶片先端渐尖，果椭圆形。产云南西双版纳。……………2. 厚叶假柴龙树 *N. collina* C. Y. Wu
1. 叶多少被毛，通常较小。
 3. 叶片基部通常对称，长圆形或倒披针形；花瓣长 6.3—7.4 毫米。……………3. 马比木 *N. pittosporoides* (Oliv.) Sleum.
 3. 叶片基部不对称，通常椭圆形；花瓣长不超过 6 毫米。
 4. 叶片大，长 10—20 厘米，宽 5—12 厘米；花盘里面和边缘被硬毛；叶柄较长（1.5—5 厘米）。……………4. 臭味假柴龙树 *N. foetida* (Wight) Sleum.
 4. 叶片小，长 3—13 厘米，宽 2—8 厘米；花盘无毛；叶柄较短（1—3 厘米）。
 5. 叶背密被长柔毛及短伏毛；果椭圆形。……………5. 毛假柴龙树 *N. tomentosa* C. Y. Wu
 5. 叶背近无毛或被极稀疏的短硬伏毛；果卵圆形。……………6. 薄叶假柴龙树 *N. obscura* C. Y. Wu

1. 假柴龙树（海南植物志）

Nothapodytes obtusifolia (Merr.) Howard in Journ. Arn. Arb. 23: 70. 1942; 海南植物志 2: 447, 图 509. 1965; Sleum. in Blumea 17: 233. 1969.——*Mappia obtusifolia* Merr. in Lingn. Sci. Journ. 14: 28, f. 9. 1935.