

灌木或乔木，高3—8(—24)米；树皮灰色，小枝圆柱形，无毛。叶互生，或枝顶近对生，叶片坚纸质或薄革质，长椭圆形或长圆状倒卵形，稀长圆形，长9—18厘米，宽3—6.5厘米，先端钝或圆形，基部楔形至急尖，两面无毛，榄绿色，侧脉6—8对，弧曲上升，在远离边缘处网结，两面均凸起，网脉稀疏；叶柄长1.2—2.5厘米，圆柱形。聚伞花序顶生，宽3—6厘米，具长3—4厘米、稍压扁的总轴，被黄色，紧贴的小柔毛。花萼钟形，长1.5毫米，径2—2.3毫米，微5裂，外面被紧贴的短柔毛，边缘稍密；花瓣白色，长圆形至披针形，长6—7.2毫米，外面密被黄色、紧贴短柔毛，里面疏被糙伏毛，先端内折；雄蕊长5.5—6.4毫米，花丝长4—5毫米，花药卵状长圆形，长2—2.7毫米；子房长3—3.7毫米，径1毫米，被糙伏毛，花柱长2毫米，略被硬毛，柱头2室；花盘薄，细圆齿状，高0.3毫米，肉质，外面无毛，具缘毛，里面被硬毛。核果长圆状倒卵形，长9—13毫米，径6—9毫米，稍平扁，顶端具短喙，幼时被硬毛，后来无毛，核薄，光滑。种子长7.8—9毫米，子叶卵形，宽5.2—6毫米，基部心形，明显具3脉，胚根圆柱形，长2.3毫米。 花果期12月至翌年4月。

特产广东海南崖县。生于低海拔林中。

2. 厚叶假柴龙树 图版 11: 10

Nothapodytes collina C. Y. Wu, 云南植物志 1: 169, 图 40, 10. 1977.

乔木或小乔木，高4—12米；小枝具棱，无毛或顶端略被毛。叶互生，干时变黑，椭圆形，长10—21厘米，宽4—8厘米，先端渐尖，基部阔楔形，两侧不对称，坚纸质，两面无毛，侧脉6—9对，与中脉在背面隆起，表面则先端微凸基部微凹，网脉细而易见；叶柄长1.5—3厘米，无毛或幼时上面略被柔毛；叶腋的芽密被白色硬毛。聚伞花序顶生，长约3.5厘米，被硬毛；花未见。核果椭圆形，幼时绿色，成熟后黑色，长约1.5厘米，宽约1厘米，基部具宿存萼。种子1枚，长约1厘米，宽约0.7厘米，子叶大，长约0.7厘米，心形，明显具5脉。

产云南西双版纳。海拔680米的沟谷密林中或疏林中。

3. 马比木(植物学名词审查本)

Nothapodytes pittosporoides (Oliv.) Sleum. in Notizbl. Berl.-Dahl. 15: 247. 1940; Howard in Journ. Arn. Arb. 23: 68. 1942; Wu et Wang in Act. Phytotax. Sin. 6: 281, 1957; Sleum. in Blumea 17: 234. 1969.——*Mappia pittosporoides* Oliv. in Hook. Ic. Pl. 18, t. 1762. 1888; Hand.-Mazz. Symb. Sin. 7: 667, 1933; Chun in Sunyatsenia 2: 72. 1934; ditto 4: 229. 1940.

矮灌木或很少为乔木，高1.5—5(—10)米，茎褐色，枝条灰绿色，圆柱形，稀具棱，嫩枝被糙伏毛，后变无毛。叶片长圆形或倒披针形，长(7—)10—15(—24)厘米，宽2—4.5(—6)厘米，先端长渐尖，基部楔形，薄革质，表面暗绿色，具光泽，背面淡绿发亮，干时通常反曲，黑色，幼时被金黄色糙伏毛，背面较密，老时无毛，侧脉6—8对，弧曲上升，在远离边缘处网结，和中脉通常亮黄色，在背面十分突起，常被长硬毛；叶柄长1—3厘米，上面具宽深槽，至少在槽里被糙伏毛。聚伞花序顶生，花序轴通常平扁，被长硬毛。花萼绿色，钟



1—2. 紫龙树 *Apodytes dimidiata* E. Meyer ex Arn.: 1. 果; 2. 子房。3—5. 假海桐 *Pittosporopsis kerrii* Craib: 3. 花, 4. 子房, 5. 花瓣。6—7. 毛假紫龙树 *Nothapodytes tomentosa* C. Y. Wu: 6. 花枝; 7. 花展开。8—9. 薄叶假紫龙树 *Nothapodytes obscura* C. Y. Wu: 8. 叶枝; 9. 花展开。10. 厚叶假紫龙树 *Nothapodytes collina* C. Y. Wu: 叶面。(李锡畴绘)