

绒毛;退化雄蕊5,长约2毫米,花丝扁线形,长约1.5毫米,花药卵状三角形,长约0.5毫米;子房近球形,长约2毫米,密被黄褐色硬伏毛,花柱极短或无,柱头盘状,5圆裂。核果椭圆形,长2—3.7厘米,宽1—1.7厘米,疏被淡黄色硬伏毛,由淡绿、黄绿转橙黄至橙红色,甜,果肉薄,干时具下陷网纹及纵槽,基部具宿存、略增大的萼片。种子1枚。花期4—8月,雌花较晚,果期6—12月。

产湖南、福建、广东、广西、贵州、云南南部及东南部至越南老街。生于海拔800—1800米的疏林、灌丛及沟谷林内。

果肉味甜可食;根或老藤药用。

8. 微花藤属——*Iodes* Bl.

Bl. in Bijdr. 29. 1825.

木质藤本,多密被锈色毛,叶间具卷须。单叶对生,很少近对生,全缘,纸质,具柄,羽状脉。聚伞状圆锥花序腋生或腋上生,花小,花柄具关节,雌雄异株。雄花:花萼杯状,5齿裂;花冠具(3—)4—5深裂,基部连合,外面密被毛;雄蕊3—5,下位,与花冠裂片同数互生,花丝宽短,稀无,花药背着至基着,内向,纵裂;退化子房无或极小。雌花:花萼与雄花相似,宿存;花冠具4—5裂片,下部管状而常扩大;退化雄蕊无;子房无柄或具极短柄,柱头厚盾状,顶端凹陷,有时略偏斜,1室,有2枚悬垂胚珠。核果斜倒卵形,具不增大的宿存萼及花冠,中果皮薄,外果皮薄壳质,内果皮外面具网状多角形陷穴,极稀平滑。种子1枚,具肉质胚乳,子叶扁平,叶状。

本属大约19种,分布热带亚洲(9种)及非洲。我国产4种,分布于西南部至南部。

分 种 检 索 表

1. 小枝具多数瘤状皮孔,老时显著突起;叶卵形或近圆形,基部心形;石山植物。……………1. 瘤枝微花藤 *I. seguini* (Lévl.) Rehd.
1. 小枝不具瘤状皮孔。
 2. 果长约3.5(3—3.8)厘米;叶背各级脉及细网脉均被淡黄色卷曲柔毛;雄花序较稀疏,具长梗。……………2. 大果微花藤 *I. balansae* Gagn.
 2. 果短于3厘米;叶背非卷曲柔毛;雄花序较密集。
 3. 雄花瓣近基部连合,先端具一长约1毫米的尾;雄花序常复合成腋生及顶生的大圆锥花序;果较大,长2—2.6厘米;叶厚纸质,背面沿脉被伸展柔毛。……………3. 微花藤 *I. cirrhosa* Turcz.
 3. 雄花瓣于下部1/2连合,先端仅具一小尖头;雄花序为腋生伞房圆锥花序;果较小,长1.3—2.2厘米;叶薄纸质,背面被粗硬伏毛。……………4. 小果微花藤 *I. vitiginea* (Hance) Hemsl.

1. 瘤枝微花藤 辣子果(云南) 图版12: 2

Iodes seguini (Lévl.) Rehd. in Journ. Arn. Arb. 15: 3. 1934; Chen in Sargentia 3: 68. 1943; Wu et Wang. in Act. Phytotax. Sin. 6: 283. 1957, p. p.; Lauener, Not. Bot. Gard. Edinb. 27: 271. 1967; Sleum. in Blumea 17: 222.