

果梗长1—2厘米。花期4月,果期9月。

产河南西南部、陕西南部、甘肃东南部、湖北西部、四川、贵州等省。生于海拔1000—2000米的林边或疏林中。模式标本采自四川巫山南部。

1b. 太白金钱槭(变种)(植物分类学报)

Dipteronia sinensis Oliv. var. *taipeiensis* Fang et Fang f. in Act. Phytotax. Sin. 11: 139. 1966.

本变种与原种的区别在于叶下面、叶柄和花轴均被宿存的灰色疏柔毛。

产陕西南部和甘肃东南部。生于海拔1000—1700米的疏林中。模式标本采自陕西太白山。

2. 云南金钱槭(中国树木分类学) 辣子树(云南), 飞天子(云南) 图版15: 3—5

Dipteronia dyerana Henry in Gard. Chron. III. 33: 22. 1903; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 17. 1939.

乔木,高7—13米。树皮平滑,灰色。小枝圆柱形,灰绿色或灰色。叶为奇数羽状复叶,长30—40厘米;小叶纸质,9—15枚,着生于长10—20厘米的叶轴上;顶生的小叶片基部楔形,具长2—3厘米的小叶柄,侧生的小叶片基部斜形,近于无小叶柄;小叶片披针形或长圆披针形,长9—14厘米,宽2—4厘米,先端锐尖或尾状锐尖,边缘具很稀疏粗锯齿;上面深绿色,下面淡绿色,中肋在上下两面均显著,被短柔毛,侧脉13—14对,在下面显著,被短柔毛。花的特性未详。果序圆锥状,顶生,长30厘米,密被黄绿色的短柔毛,每果梗上着生两个扁形的果实,圆形的翅环绕于其周围,直径4.5—6厘米,嫩时绿色,成熟时黄褐色;果梗长2厘米,密被短柔毛。花期不明,果期9月。


产云南东南部和贵州西南部。生于海拔2000—2500米的疏林中。模式标本采自云南蒙自。

本种除有特殊的观赏价值外,又可作绿化树种。种子含很丰富的脂肪,榨油可作食用及工业用。

2. 槭属——*Acer* Linn.

Linn. Sp. Pl. ed. 1. 1054. 1753 & Gen. Pl. ed. 5. 474. 1754.

乔木或灌木,落叶或常绿。冬芽具多数覆瓦状排列的鳞片,或仅具2或4枚对生的鳞片。叶对生,单叶或复叶(小叶最多达11枚),不裂或分裂。花序由着叶小枝的顶芽生出,下部具叶,或由小枝旁边的侧芽生出,下部无叶;花小,整齐,雄花与两性花同株或异株,稀单性,雌雄异株;萼片与花瓣均5或4,稀缺花瓣;花盘环状或微裂,稀不育;雄蕊4—12,通常8,生于花盘内侧、外侧,稀生于花盘上;子房2室,花柱2裂稀不裂,柱头通常反卷。果实系2枚相连的小坚果,凸起或扁平,侧面有长翅,张开成各种大小不同的角度。



1—2. 金钱槭 *Dipteronia sinensis* Oliv.: 1. 果枝; 2. 叶的一部分示其边缘的锯齿。 3—5. 云南金钱槭 *Dipteronia dyerana* Henry: 3. 果枝; 4. 小枝的一段放大示其毛; 5. 叶的一部分放大示其下面的毛。
(王利生绘)