

7: 233. 1886.

花杂性,雄花与两性花同株,多数花组成的伞房花序,着生于小枝顶端;萼片与花瓣各5,黄绿色;雄蕊5—8,生于花盘内侧的边缘;花盘肥厚、盘状。小坚果扁平或压扁状,脉纹不显著,翅张开成水平至近于直立。乔木稀灌木,冬芽卵圆形,鳞片稀少、覆瓦状排列。单叶,秋季脱落,通常3—5裂或不分裂,如分裂时裂片的边缘常系全缘,稀成波状,极稀纤毛状或锯齿状,叶柄有乳状液汁。

本组的后选模式种: 桐状槭 *A. platanoides* Linn.

本组现分2系。

系1. 篱笆槭系——Ser. 1. *Campestris* (Pax) Pojark. in Act. Inst. Bot. Acad. Sc. USSR I. 1: 297. 1933.

乔木,冬芽细小,鳞片覆叠;叶3—5裂,裂片钝圆;花序伞房状,被淡黄色短绒毛或长柔毛,萼片与花瓣各5,边缘纤毛状,雄蕊8、着生于花盘中部;翅果张开近于水平或稍反卷,常有淡黄色短绒毛,稀无毛。

本系的模式种: 篱笆槭 *A. campestre* Linn.

本系共有4种: 欧洲和日本各1种。我国现仅有2种。

1. 庙台槭(植物分类学报) 留坝槭(植物分类学报) 图版16: 1—2


*Acer miaotaiense* P. C. Tsoong in Kew Bull. (1954): 83. 1954, sphalm. "miaotense", & in Act. Phytotax. Sin. 3:415. 1955, in nota.—*A. miyabei* subsp. *miaotaiense* (P. C. Tsoong) E. Murr. *Kalmia* 1: 6, 19. 1969.

高大的落叶乔木,高20—25米。树皮深灰色、稍粗糙。小枝近于圆柱形,当年生枝紫褐色、无毛,多年生枝灰色,皮孔淡黄色、近于椭圆形。叶纸质,外貌近于阔卵形,长7—9厘米,宽6—8厘米,基部心脏形或近于心脏形、稀截形,常3—5裂,裂片卵形、先端短急锐尖,边缘微呈浅波状,裂片间的凹块钝形,上面深绿色,无毛,下面淡绿色有短柔毛,沿叶脉较密;初生脉3—5条和次生脉5—7对均在下面较在上面为显著;叶柄比较细瘦,长6—7厘米,基部膨大,无毛。花的特性未详。果序伞房状,连同长8—10毫米的总果梗在内约长5厘米,无毛;果梗细瘦,约长3厘米。小坚果扁平,长与宽均约8毫米,被很密的黄色绒毛;翅长圆形,宽8—9毫米,连同小坚果长2.5厘米,张开几成水平。花期不明,果期9月。

产陕西西南部和甘肃东南部。生于海拔1300—1600米的阔叶林中。模式标本采自陕西留坝县庙台子留侯庙。

2. 羊角槭(浙江俗名)(植物分类学报) 图版16: 3—4

*Acer yanjuechi* Fang et P. L. Chiu in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 61, Pl. 7: 1. 1979.



1—2.庙台槭 *Acer miaotaiense* P. C. Tsoong: 1.果枝; 2.翅果。3—4.羊角槭 *Acer yanjuechi* Fang et P. L. Chiu: 3.果枝; 4.花。(冯先洁绘)