

Acer leptophyllum Fang in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 61, Pl. 7; 2. 1979.

落叶乔木，高达10米。树皮深灰色、粗糙。小枝近于圆柱形，无毛，当年生枝淡灰色或淡绿灰色，直径2毫米，具叶2—4枚，多年生枝灰色，皮孔稀少，近于圆形，叶薄纸质或膜质，基部深心脏形，外貌近于圆形，长与宽均约6—7厘米，常7裂，中央裂片均三角状卵形，长2—2.5厘米，基部宽2—2.5厘米，先端短急锐尖，尖头长6毫米，基部的裂片细小，钝形或三角形，裂片间的凹缺钝形，上面绿色，下面淡绿色；主脉7条，在上面微显著，在下面显著；次生脉与小叶脉均不显著；叶柄淡紫色，长6—7厘米，上面微呈浅沟状，下面圆形。花的特性未详。果序伞房状，紫色，无毛，连同长1—1.2厘米的总果梗在内共长4厘米，果梗细瘦，长3厘米。小坚果淡黄色，压扁状，长圆形，长1厘米，宽5毫米；翅镰刀形，宽7—8毫米，连同小坚果长2.3—2.5厘米。张开成锐角。花期不明，果期9月。

产江西西北部。生于海拔300米的疏林中。模式标本采自江西永修云居山。

本种与元宝槭 *A. truncatum* Bunge 相近，但本种的叶较细而薄，通常长与宽约6—7厘米，基部深心脏形，显著地7裂，果序伞房状，淡紫色，较短，包括长1—1.2厘米的总果梗在内，共长4厘米；翅果较小，长2.3—2.5厘米，张开成锐角，极易于区别。

4. 薄叶槭 (植物分类学报) 瘦槭 (经济植物手册) 图版18: 1

Acer tenellum Pax in Hook. Ic. Pl. 19: t. 1897. 1889 & in Engl. Pfl.-anzenreich 8 (IV. 163): 53, f. 9. 1902; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 47. 1939. — *A. cappadocicum* var. *rotundilobum* E. Murr. Kalmia 8: 4. 1977, pro parte.

4a. 薄叶槭 (原变种)

Acer tenellum Pax var. **tenellum**

落叶乔木，高7米。树皮灰色或深灰色，平滑。小枝细瘦；当年生枝淡紫色，无毛或近于无毛，多年生枝淡灰色或灰绿色，具椭圆形或卵圆形的皮孔。叶膜质或薄纸质，基部近于心脏形或近于圆形，叶片外貌近于卵形或圆形，长4—6厘米，宽3—6厘米，通常3裂稀不分裂；中央的裂片钝形，钝尖形或稀锐尖，全缘或微呈浅波状，两侧的裂片钝形，先端锐尖或不发育，全缘；裂片间的凹缺常成钝尖；上面深绿色，无毛，下面淡绿色，除脉腋被丛毛外其余部分无毛；主脉3条稀5条，在上面微显著，在下面微凸起，侧脉在上面不现，在下面微显著，叶柄细瘦，无毛，长2—3厘米，上面淡紫色，下面绿色，伞房花序无毛顶生，于着叶的小枝上，花序长约1厘米；花黄绿色，杂性，雄花与两性花同株，开花与叶的生长同时；萼片5，长圆形，两面均无毛，边缘微被纤毛，长2—3毫米；花瓣5，长圆倒卵形，无毛，长2—3毫米；雄蕊8—10，在雄花中与花瓣等长或略短，花丝无毛，花药黄色；花盘微裂，无毛，位于雄蕊的外侧，子房无毛，扁形，花柱无毛，很短，上段2裂，柱头反卷，翅果无毛，嫩时紫色，成熟时黄褐色，小坚果压扁状，长8毫米，宽6毫米，翅中段最宽，宽达7毫米，连同小坚果长2—2.2厘米，张开近于水平或略反卷；果梗细瘦，长约2.5厘米。花



1. 薄叶槭 *Acer tenellum* Pax 果枝。2. 元宝槭 *Acer truncatum* Bunge 果枝。(张泰利绘)