

7. 青皮槭(中国树木分类学) 图版 19: 2

Acer cappadocicum Gled. in Schrift Ges. Naturf. Freunde Berlin 6: 116, f. 2. 1785; Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 84. 1911; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 35. 1939. — *A. cultratum* Wall. Pl. As. Rar. 2: 4. 1830. — *A. laetum* C. A. Mey. Verz. Kauk. Pflanz. 206. 1831. — *A. lobelii* var. *indicum* Pax in Bot. Jahrb. 7: 236. 1886. — *A. laetum* var. *cultratum* (Wall.) Pax in Engl. Pflanzenreich 8 (IV. 163): 48. 1902. — *A. cappadocicum* var. *indicum* (Pax) Rehd. in Sargent, Pl. Wils. 1: 86. 1911. — *A. cappadocicum* var. *cultratum* (Wall.) Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 36. 1939.

7a. 青皮槭(原变种)

Acer cappadocicum Gled. var. *cappadocicum*

落叶乔木,高 15—20 米,冬芽卵圆形,鳞片覆叠。小枝平滑紫绿色,无毛。叶纸质,宽 14—20 厘米,长 12—18 厘米,基部心脏形、稀近于截形,常 5—7 裂,裂片三角卵形,先端锐尖或狭长锐尖,边缘全缘,上面深绿色、无毛,下面淡绿色,除脉腋被丛毛外其余部分无毛;主脉 5 条,在上面显著,在下面凸起,侧脉仅在下面微显著;叶柄长 10—20 厘米。花序伞房状,无毛。花杂性,雄花与两性花同株,黄绿色。小坚果压扁状,翅宽 1.5—1.8 厘米,连同小坚果共长 4.5—5 厘米,张开近于水平或成钝角,常略反卷。花期 4 月,果期 8 月。

产我国西藏南部。生于海拔 2400—3000 米的疏林中。广布于土耳其、伊朗、尼泊尔和巴基斯坦。

青皮槭的变种检索表

1. 叶 5—7 裂;翅果张开近于水平或钝角。

2. 叶较大,长 12—18 厘米,宽 14—20 厘米;翅果较大,长 4.5—5 厘米。 7a. 青皮槭(原变种) *A. cappadocicum* Gled. var. *cappadocicum*

2. 叶较小,长 5—6 厘米,宽 6—8 厘米;翅果较小,长 2.8—3.2 厘米(西藏南部) 7b. 短翅青皮槭(变种) *A. cappadocicum* Gled. var. *brevialatum* Fang

1. 叶 5 或 3 裂;翅果张开成锐角至钝角。


3. 叶较大,长 5—8 厘米,宽 6—10 厘米,常 5 裂;翅果长 2.5—3 厘米(湖北、四川、云南) 7c. 小叶青皮槭(变种) *A. cappadocicum* Gled. var. *sinicum* Rehd.

3. 叶较小,长 4—6 厘米,宽 5—7 厘米,常 3 裂,稀 5 裂;翅果长 2—3 厘米(陕西、甘肃、湖北、四川、云南) 7d. 三尾青皮槭(变种) *A. cappadocicum* Gled. var. *tricaudatum* (Rehd. ex Veitch) Rehd.

7b. 短翅青皮槭(变种)(植物分类学报) 图版 20: 3

Acer cappadocicum Gled. var. *brevialatum* Fang in Act. Phytotax. Sin.

17 (1): 63, Pl. 7: 3. 1979.



1. 色木槭 *Acer mono* Maxim. 果枝。2. 青皮槭 *Acer cappadocicum* Gled. 果枝。(冯先洁绘)