

面均仅微显著,达于边缘,小叶脉不显著;叶柄细瘦,淡绿色或淡紫绿色,无毛,长4—6厘米。花序圆锥状,长4—6厘米,紫绿色,无毛。花绿色,细小;萼片5,卵形,内侧被稀疏的长柔毛;花瓣5,白色,阔倒卵形,短于萼片;雄蕊8,与萼片大约等长,花丝无毛;花盘位于雄蕊外侧,有长柔毛;子房密被长柔毛。翅果嫩时淡紫色,成熟后淡黄色,小坚果凸起,近于球形,直径5毫米,翅镰刀形,宽8毫米,连同小坚果长2.3—2.8厘米,张开近于水平,花期5月,果期9月。

产我国西藏南部和东南部。生于海拔2500—3700米的混交林中。锡金也有分布。模式标本采自锡金。

38. 盐源槭(植物分类学报) 宁远槭(植物分类学报)

*Acer schneiderianum* Pax et Hoffm. in Fedde, Repert. Sp. Nov. Beih. 12: 435. 1922; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 87. 1939. — *A. campbellii* subsp. *schneiderianum* (Pax et Hoffm.) E. Murr. Kalmia 8: 2. 1977.

38a. 盐源槭(原变种)

*Acer schneiderianum* Pax et Hoffm. var. *schneiderianum*

落叶乔木,高约6米。树皮平滑,灰色或灰褐色。小枝细瘦,无毛,当年生嫩枝紫色或紫绿色,多年生老枝黄绿色或褐绿色。叶嫩时膜质,后成纸质,近于圆形,长与宽均系7—8厘米,基部近于心脏形或截形,5—7裂,裂片长卵圆形或三角卵形,先端锐尖,边缘有锐尖的细锯齿;裂片间的凹缺锐尖,深达叶片的中部,上面深绿色,无毛,下面淡绿色,无毛或在脉腋有短柔毛;叶柄长4—5.5厘米,无毛或近顶端部分微被短柔毛。花杂性,雄花与两性花同株,多数组成无毛的伞房状圆锥花序,长3—4厘米,总花梗长2—3厘米;花梗细瘦、无毛,长0.6—1.2厘米;萼片5,淡绿色,长圆形,长3毫米,宽1.5毫米,边缘具纤毛;花瓣5,淡黄色,卵状长圆形,短于萼片;雄蕊8,无毛,长3—5毫米;花盘位于雄蕊外侧,疏被白色疏柔毛;子房密被白色长柔毛,花柱无毛,长1.5毫米,2裂,柱头反卷。翅果嫩时紫红色,成熟后淡黄色;小坚果特别凸起,近于球形,脉纹显著,直径4毫米;翅长圆形或长圆倒卵形,宽6—7毫米,连同小坚果长2.3—2.5厘米,张开近于水平。花期5月,果期9月。

产四川西南部。生于海拔2500—3000米的林中。模式标本采自盐源县北部元宝区和瓜别区之间。

38b. 柔毛盐源槭(变种)(植物分类学报)

*Acer schneiderianum* Pax et Hoffm. var. *pubescens* Fang et Wu, in Act. Phytotax. Sin. 17(1): 72. 1979.

本变种与原种的区别在于本变种的叶的下面有很密的淡黄色短柔毛,翅果较小,长2.3—2.5厘米,小坚果近于球形,直径5毫米,翅倒卵形,宽1厘米,基部狭窄,仅宽3毫