

形皮孔。叶近于革质,外貌圆形,长9—11厘米、宽11—13厘米,基部近于心脏形或截形,通常7裂稀5裂,中央裂片与侧裂片长圆卵形或卵形,先端突然锐尖,基部的裂片比较小,三角卵形,裂片间的凹缺成锐尖,边缘具稀疏的圆齿,上面有光泽、淡紫绿色或绿色,下面淡绿色;主脉在上面显著,在下面凸起,侧脉常平展,在两面均系微现;叶柄粗壮,圆柱形,长3—5厘米,基部膨大,上面有沟纹、下面圆形。花的特性未详。圆锥果序长5—6厘米。翅果嫩时淡紫色,成熟时黄褐色;小坚果卵圆形,长6毫米,宽4毫米,翅倒卵形,宽8毫米,连同小坚果长2.5—3厘米,张开成钝角;果梗长5毫米。花期不明,果期9月。

产云南东南部和广西西部。生于海拔1200—2100米的林中。模式标本采自云南西畴。

本种与中华槭 *A. sinense* Pax 的亲缘关系很相近,区别在于本种的叶常7裂,边缘具圆齿,翅果较小,密集成仅长5—6厘米的短圆锥果序。

41. 马边槭(植物分类学报) 纤瘦槭(植物分类学报) 图版45: 1

*Acer mapienense* Fang in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 73, 1979. — *A. gracile* sensu Fang et Fang f., op. cit. 11: 155. 1966, non Saporta 1867.

落叶乔木,高达10米。树皮平滑,紫褐色。小枝细瘦,无毛,当年生嫩枝紫绿色,多年生老枝灰褐色或紫褐色。叶纸质,外貌近于圆形,长8—9厘米,宽9—10厘米,基部近于截形稀近于心脏形,5裂,基部常有2枚小的裂片致成7裂,裂片长圆形或长圆卵形,先端锐尖,尖头微弯曲,边缘具紧贴的锯齿,中央裂片的长度为叶片长度的1/2,裂片间的凹缺锐尖,上面绿色,无毛,下面淡绿色,除脉腋被丛毛外其余部分无毛;主脉5条,在上面显著,在下面微凸起,侧脉不显著或微显著;叶柄细瘦,长5—6.5厘米,淡紫绿色,无毛。花的特性未详。圆锥果序,长14—16厘米,常下垂,总果梗长4厘米,翅果紫绿色,小坚果长卵圆形,长4毫米,直径3毫米;翅近于镰刀形,近先端最宽、宽达8毫米,连同小坚果长2—2.2厘米,张开成钝角;果梗细瘦,无毛,长1—1.2厘米。花期不明,果期9月。

产四川西南部。生于海拔2000—2500米的山坡疏林中。模式标本采自马边大竹堡。

本种与扇叶槭 *A. flabellatum* Rehd. 的亲缘关系很相近,区别在于本种的叶有时5裂,基部近于截形,果实较小,翅连同小坚果仅长2—2.2厘米,张开成钝角。

42. 中华槭(峨眉植物图志) 华槭(植物分类学报), 华槭树(经济植物手册), 丫角树(中国树木分类学) 图版45: 2

*Acer sinense* Pax in Hook. Ic. Pl. 19; sub t. 1897. 1889 et in Engl. Pflanzenreich 8 (IV. 163): 22. 1902; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China bot. ser. 11: 81. 1939, pro parte. — *Liquidambar rosthornii* Diels in Bot. Jahrb. 29: 380. 1900. — *A. sinense* var. *typicum* Pax, op. cit. 8 (IV. 163): 22. 1902.

42a. 中华槭(原变种)



1. 马边槭 *Acer mapienense* Fang: 果枝。2. 中华槭 *Acer sinense* Pax: 果枝。3. 多果槭 *Acer prolificum* Fang et Fang f.: 果枝。(冀朝桢绘)