

产湖北西部、四川东部及西南部。生于海拔 1500—2000 米的混交林中。模式标本采自湖北兴山。

42d. 小果中华槭(变种)(植物分类学报)

*Acer sinense* Pax var. *microcarpum* Metc. in Lingnan Sc. Journ. 20: 223. 1942.

本变种与原种的区别在于本变种的翅果较小,翅亦较短,小坚果连同翅仅长 2 厘米,张开成锐角,叶的裂片常较短而宽。花期不明,果期 9 月。

产广西西北部。生于海拔 1400 米的疏林中。模式标本采自凌云瑶马山。

42e. 波缘中华槭(变种)(植物分类学报) 图版 46

*Acer sinense* Pax var. *undulatum* Fang et Wu in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 73, 1979.

本变种与原种的区别在于本变种的叶系纸质,直径 10—12 厘米,上面有光泽,5 裂,裂片卵形或长圆卵形,先端尾状锐尖或锐尖,边缘浅波状或近于全缘,翅果长 3—3.5 厘米,张开成钝角,小坚果近于圆形,略扁而平滑。花期不明,果期 9 月。

产云南南部。生于海拔 1300 米的山谷疏林中。模式标本采自勐海南糯山。

43. 信宜槭(植物分类学报)

*Acer sunyiense* Fang, in Act. Phytotax. Sin. 11: 154. 1966.

落叶小乔木,高 3 米。树皮淡紫绿色,平滑。小枝细瘦,圆柱形,无毛,淡紫绿色。冬芽淡绿色,圆锥状卵圆形,鳞片三角形,边缘具淡白色纤毛。叶纸质,基部心脏形稀近于截形,叶片的外貌近于五角形,长 10—11 厘米,宽 12—13 厘米,常很深的 5 裂,裂片狭窄披针形,先端长尾状锐尖,中部裂片与侧裂片较长,常长 7—8 厘米,宽 1.6—1.8 厘米,中央裂片直立,斜向伸展,基部的裂片较短,仅长 2—2.2 厘米,宽 1—1.2 厘米,常平展,边缘有锯齿,裂片间的凹缺锐尖,深达叶片长度的五分之四,上面绿色、有光泽,无毛,下面淡绿色,除脉腋被淡黄色丛毛外其余部分无毛;主脉 5 条,在上面显著,在下面凸起,侧脉 17—18 对,在两面均仅微显著,小叶脉不发育;叶柄粗壮,长 5—6 厘米,紫绿色,无毛。花的特性未详。翅果长 3.5 厘米;小坚果凸起,卵圆形,长 8 毫米,宽 5 毫米,脉纹显著,翅镰刀形,宽 1.2 厘米,基部稍狭窄,张开成锐角。花期不明,果期 9 月。

产广东西南部。生于山谷疏林中。模式标本采自信宜。

本种与中华槭 *A. sinense* Pax 相近,区别在于本种的叶很深地 5 裂,裂片狭窄披针形而先端尾状锐尖,翅张开成锐角。

44. 西畴槭(植物分类学报) 图版 47: 2

*Acer sichourense* (Fang et Fang f.) Fang, in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 74, Pl. 12 1979.——*A. angustilobum* var. *sichourense* Fang et Fang f. op. cit. 11: 161. 1966.