

产湖北西部、四川东部、江西、湖南、贵州、云南、广东北部和广西北部。在巫山峡和邻近的瞿塘、西陵等三峡中极常见。生于海拔 1400—2000 米的疏林中。模式标本采自湖北巴东巫山峡。

57b. 长尾三峡槭(变种)(植物分类学报)

Acer wilsonii Rehd. var. *longicaudatum* (Fang) Fang in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 77, 1979. — *A. angustilobum* var. *angustilobum* f. *longicaudatum* Fang, op. cit. 11: 160. 1966.

本变种较之原种区别在于本变种的叶系纸质, 3 裂, 裂片狭窄披针形, 长 7—9 厘米, 边缘有稀疏而紧贴的锯齿, 先端长尾状锐尖, 尖尾长 2—3 厘米, 有时基部还有 2 个小的钝尖裂片, 致成 5 裂; 翅果长 2.5 厘米, 张开近于水平。 花期不明, 果期 9 月。

产广东西北部、广西北部和云南东南部。生于低海拔的疏林中。模式标本采自广东连山。

57c. 钝角三峡槭(变种)(植物分类学报)

Acer wilsonii Rehd. var. *obtusum* Fang et Wu in Act. Phytotax. Sin. 17 (1): 77, 1979.

本变种与原种的区别在于本变种的叶系纸质或近革质, 常 3 裂, 裂片披针形或长圆卵形近于全缘; 翅果长 2.5—3 厘米, 张开成钝角。 花期不明, 果期 9 月。

产江西西北部。生于海拔 500—1500 米的疏林中。模式标本采自修水九岭山。

58. 岭南槭(植物分类学报) 岭南槭树(中国树木分类学) 图版 51: 2

Acer tutcheri Duthie in Kew Bull. (1908): 16. 1908; Dunn in Journ. Linn. Soc. bot. ser. 39: 414. 1911 & in Kew Bull. Add. ser. 10: 67. 1912; Fang in Contrib. Biol. Lab. Sc. Soc. China Bot. ser. 11: 111. 1939. — *Liquidambar edentata* Merr. in Journ. Arn. Arb. 8: 6. 1927. — *A. oliverianum* var. *tutcheri* (Duthie) Metc. ex Kussm. Handb. Laubgeh. 1: 104. 1959.

58a. 岭南槭(原变种)

Acer tutcheri Duthie var. *tutcheri*

落叶乔木, 高 5—10 米。树皮褐色或深褐色。小枝细瘦, 无毛, 当年生枝绿色或紫绿色, 多年生枝灰褐色或黄褐色。冬芽卵圆形, 叶纸质, 基部圆形或近于截形, 外貌阔卵形, 长 6—7 厘米, 宽 8—11 厘米, 常 3 裂稀 5 裂; 裂片三角状卵形, 稀卵状长圆形, 先端锐尖, 稀尾状锐尖, 边缘具稀疏而紧贴的锐尖锯齿, 稀近基部全缘, 仅近先端具少数锯齿, 裂片间的凹缺锐尖, 深达叶片全长的 $\frac{1}{3}$, 上面深绿色, 下面淡绿色, 无毛, 稀在脉腋被丛毛; 叶柄长约 2—3 厘米, 细瘦, 无毛。花杂性, 雄花与两性花同株, 常生成仅长 6—7 厘米的短圆锥花序, 总花梗长约 3 厘米, 顶生于着叶的小枝上, 叶已长大后花始开放; 萼片 4, 黄绿色, 卵状长圆形, 先端钝形, 长约 2.5 毫米; 花瓣 4, 淡黄白色, 倒卵形, 长约 2 毫米; 雄蕊 8, 花



1. 三峡槭 *Acer wilsonii* Rehd; 果枝。 2. 岭南槭 *Acer tutcheri* Duthie; 果枝。 3. 小果岭南槭 (变种) *Acer tutcheri* Duthie var. *shimadai* Hayata; 果枝。(冯先洁绘)